

Exploitation : N° EDE : Commune :	<b>Investigation de la qualité de la détection et des traitements individuels contre la dermatite digitée réalisés par l'éleveur</b> Date : Observateur :
---	---

Qualité de la détection des animaux atteints de DD par l'éleveur			
Critères	Observé	Objectif	Seuil d'alerte
Connaissances des lésions typiques de DD		Différentiation lésion active DD / guérie, autres lésions	Confusion lésion active/guérie ou avec autres lésions podales
Moment de la détection		Précoce : inspection systématique des vaches en lactation toutes les 3 semaines en salle de traite*	Tardive : boiterie uniquement Aucune inspection des pieds
Qualité de la réalisation des traitements individuels par l'éleveur			
Critères	Observé	Objectif	Seuil d'alerte
Critère d'application de topiques individuels		Sur toute lésion détectée (même lors de séances de parage)	Jamais
Nettoyage du pied avant traitement topique		Systématique	Jamais
Produit utilisé**		Antibiotique ou désinfectant avec une AMM pour la DD ou pour les plaies cutanées à Tréponèmes	Antibiotique sans AMM pour la DD ou pour les plaies cutanées à Tréponèmes
Application du produit		Spray : 1 application = 2 pulvérisation espacées de 15 secondes Onguent, gel : application avec matériel à usage unique	Spray : 1 application = 1 seule pulvérisation
Durée du traitement		Application jusqu'à guérison	1 seule application sans pansement
Gestion des lésions sévères		Traitement en levant le pied si absence de guérison au bout de 10 jours	Traitement uniquement sans lever le pied
Suivi du traitement		Marquage du pied traité (par exemple : 1 trait par application sur le canon) et vérification état de guérison*	Pas de marquage du pied traité et plusieurs éleveurs
Suivi du traitement (cas des pansements)		Retrait du pansement au bout de 4 jours	Pas de retrait du pansement

\* utilisation du guide pour la détection des lésions de DD en salle de traite

\*\* cf. liste des produits disponibles en France et recommandations d'application