



ATELIER D :

LE PATURAGE DES CHEVRES : UN PEU BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT...



Pour une production laitière de 3 kg/jour



Durée utilisation du pâturage

Durée utilisation du foin

Quantité brute moyenne journalière de foin ingérée

Quantité brute moyenne journalière de concentrés distribués

Coût moyen journalier du concentré (300 €/T)



Coût moyen journalier du concentré (350 €/T)



	A	B	C	D	E
Durée utilisation du pâturage	0	3 mois - 5 h/j	6 mois - 5 h/j	3 mois - 10 h/j	6 mois - 10 h/j
Durée utilisation du foin	6 mois	6 mois	6 mois	3 mois	0
Quantité brute moyenne journalière de foin ingérée	2,1 kg	1,6 kg	1,1 kg	1,1 kg	0
Quantité brute moyenne journalière de concentrés distribués	1,25 kg	1,1 kg	0,95 kg	0,98 kg	0,7 kg
Coût moyen journalier du concentré (300 €/T)	0,38 €	0,33 €	0,29 €	0,29 €	0,21 €
Coût moyen journalier du concentré (350 €/T)	0,44 €	0,39 €	0,33 €	0,34 €	0,25 €
Foin (50 % MAT RGA - 50 % TV) 2 ^{ème} coupe	UFL 0,7	UEL 1,02	% MAT 15		
Herbe (mélanges Patuchev lot SP)	0,8	1	17		
Concentrés	0,9		18		

Les règles d'or pour réussir le pâturage

- Une prairie de qualité et une bonne présence de légumineuses
- Un pâturage précoce : mi février-mars
- 1 h de présence = 200-250 g de MS ingérée
- Moins de 700 g de concentrés si pâturage à volonté pendant 10 h
- Au moins 45 jours entre 2 exploitations en pâturage et un suivi régulier du parasitisme
- Hauteur d'entrée 14 cm
- Hauteur de sortie 8 cm
- Un changement régulier de parcelles pour stimuler l'ingestion

Le pâturage, c'est simple!

- Pas de distribution de foin si 10 h de présence sur la parcelle
- 1 fil électrique suffit pour contenir des chèvres ayant de l'herbe à disposition
- Pas d'abreuvement nécessaire si les chèvres restent moins de 8 h sur la parcelle
- Transition sur 2 à 3 semaines
- Très bonne adaptabilité de la chèvre

Intervenants :

Hugues Caillat (INRA),
Carine Paraud (ANSES),
Félix Muller (CIVAM du Haut-Bocage).

Avec le soutien financier de :





ATELIER D :

LE PATURAGE DES CHEVRES : UN PEU BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT...

RENFORCER LES DEFENSES DE L'HOTE :

- Améliorer la résistance génétique
- Améliorer la ration



REGULER LA POPULATION DE VERS ADULTES :

- Raisonner l'utilisation des anthelminthiques : traitements sélectifs (production laitière, état corporel, FAMACHA, ...)
- Utiliser des nutriments : tanins condensés


Comment évaluer le parasitisme dans mon troupeau

- Réaliser des **coprosopies** : comptage des œufs de strongles digestifs
 - . Prélèvements de matières fécales de groupe
 - . A des moments-clés ou à la demande si signes évocateurs de parasitose
- **Interpréter les résultats obtenus** en combinant :
 - . Niveau d'excrétion
 - . Statut immunitaire du troupeau (âge, stade physiologique)
 - . Moment de l'année

REGULER LA SOURCE DE CONTAMINATION :

- Gérer le pâturage et le parcellaire (pâturage tournant, mixte/alterné, fauche)
- Utiliser des nutriments : tanins condensés

Densité de L3




Pâturage tournant

Fauche intercalaire

Irrigation - Soleil +

Exemple de suivi coproscopique pluri-annuel (moyenne obtenue à partir de coprosopies de groupe de 10 troupeaux du CIVAM du Haut Bocage)



Intervenants :

Hugues Caillat (INRA),
Carine Paraud (ANSES),
Félix Muller (CIVAM du Haut-Bocage).

Avec le soutien financier de :

