

Journée technique sur les boiteries des bovins

17 juin 2019 – Paris.



Wopa

MS Schippers
L'élevage votre Passion



Lésions podales et lien avec les pratiques en élevages laitiers

T. Decers (FCEL)



Lésions podales et lien avec les pratiques en élevages laitiers

Lundi 17 juin 2019 – SNH Paris
Journée technique boiteries des bovins



FRANCE CONSEIL ELEVAGE



Fédération nationale des entreprises de conseil en élevage
Anciennement France Contrôle Laitier changement de nom en 2010


● 3 FILIERES REPRESENTEES :



BOVINS LAIT



CAPRINS



BOVINS VIANDE

● **88 ENTREPRISES**
de conseil en élevage




● **13 SALARIÉS**
À LA FÉDÉRATION





UN RESEAU DE PARAGE ACTIF

● Près de 70 pareurs en action




 ECEL ayant une activité parage

DES PAREURS CONNECTES



- 4 outils de saisie utilisés dans le réseau
- 1 seule façon d'enregistrer les lésions : le référentiel PARABOV





LE PROJET RES'FEET

- Une enquête est fournie à l'éleveur à la fin du chantier de parage pour caractériser l'élevage





- 10 ECEL associent leurs compétences et leurs données pour valoriser les données de parage et créer de la connaissance



LE PROJET RES'FEET

Création d'un observatoire web pour consulter des résultats de manière interactive

Publication d'un rapport sur la valorisation des données de l'année précédente





RESULTATS SUR DONNEES DE 2018

- Compilation des données :
 - Enquête
 - Lésions
 - Contrôle Laitier
- 305 élevages parés
- 20 738 vaches parées




RESULTATS SUR DONNEES DE 2018

● Caractérisation des vaches de l'étude

Répartition des races de vaches parées

Seules les races représentant plus de 1% du total sont affichées




Différences de représentativité des vaches parées par rapport à la population nationale : sur-représentation du croissant laitier dans les ECEL qui font du parage.

Les primipares sont statistiquement moins parées : pas assez de parage préventif en élevage

Parités des vaches parées

Seuls les rangs représentant plus de 1% sont affichés






RESULTATS SUR DONNEES DE 2018

● Répartition des lésions relevées sur les vaches parées

Pourcentage de vaches atteintes par chacune des lésions, selon la gravité des lésions



15 % de vache saine


Lésion de mortellaro
Erosion de talons
Ouverture de ligne blanche



RESULTATS SUR DONNEES DE 2018


Répartition des lésions relevées sur les vaches parées selon la présence de pâturage

Présence de pâturage




Oui

Pourcentage de vaches atteintes par chacune des lésions, selon la gravité des lésions



Non

Pourcentage de vaches atteintes par chacune des lésions, selon la gravité des lésions






RESULTATS SUR DONNEES DE 2018

● Répartition des lésions relevées sur les vaches parées selon le type de couchage

Type de couchage




Distinction logettes lisier/fumier au seuil de 1,5 kg de paille/VL/j




RESULTATS SUR DONNEES DE 2018


Aire Paillée



Logettes fumier



Logettes lisier






RESULTATS SUR DONNEES DE 2018




Répartition des lésions relevées sur les vaches parées selon le système de raclage




Chaîne de raclage automatisée

Pourcentage de vaches atteintes par chacune des lésions, selon la gravité des lésions



Tracteur + rabet

Pourcentage de vaches atteintes par chacune des lésions, selon la gravité des lésions









RESULTATS SUR DONNEES DE 2018

Répartition des lésions relevées sur les vaches parées selon le temps obligatoirement debout



FRANCE
CONSEIL ÉLEVAGE

Répartition du temps obligatoirement debout (Traite + Cornadis)
(heures par jour)






RESULTATS SUR DONNEES DE 2018

- Des différences qui ressortent sur les lésions, mais des tendances sur les systèmes d'élevages :
 - Association Aire Paillée / Pâturage / Tracteur + rabet
 - Association Logettes Lisier / Pas de pâturage / Chaîne de raclage automatisée
- Analyse multifactorielle à venir pour lever ces corrélations induites



RESULTATS SUR DONNEES DE 2018

● Association des lésions entre elles






RESULTATS SUR DONNEES DE 2018

● Association des lésions entre elles

Aire Paillée

Logettes lisier





CONCLUSION

- Initiation d'un travail de valorisation des données de parage au sein du réseau FCEL
- Des premières informations cohérentes avec l'état de l'art ressortent
- Une étude plus complète à venir prochainement



MERCI
DE VOTRE
ATTENTION



FRANCE
CONSEIL ÉLEVAGE