

Exploitation :	Investigation de la qualité de la désinfection des pieds des bovins réalisée par l'éleveur
N° EDE :	
Commune :	
	Date :
	Observateur :

Inspection de l'emplacement du pédiluve

Cette inspection est à réaliser dans 2 situations :

- Si un pédiluve est déjà utilisé
- Si un pédiluve est envisagé (> 10 % des pieds arrières atteints par des lésions actives de DD – cf. **Guide d'intervention pour le contrôle de la DD en troupeaux bovins laitiers**)

Qualité de l'emplacement du pédiluve		<input type="checkbox"/> existant	<input type="checkbox"/> potentiel
Critères	Observé	Objectif	Défauts potentiels*
Fluidité de la circulation		Pas de ralentissement de la traite	Pédiluve trop près de la sortie de la salle de traite Marche avant pédiluve Angle avant pédiluve Angle après pédiluve Manque d'habitude (primipares)
Canalisation des animaux		Absence d'évitement	Mauvais ajustement des barrières de contention
Dimensions du pédiluve		L : 3 m (min : 2,5 m) l : 0,9 m (min : 0,7 m) h : 20 cm (min : 15 cm)	–
Pente du sol		0 -2%	–
Exposition aux eaux de pluie		Aucune	Pédiluve extérieur Pédiluve exposé aux vents dominants
Risque d'intoxication (désordres digestifs suite à ingurgitation)		Aucun risque : pas d'ingurgitation possible des solutions de pédiluve	Risque potentiel : Pédiluve contigu à l'aire d'attente Stagnation des animaux en sortie du pédiluve
Facilité de mise en place		Déplacement et remplissage faciles	Poids du pédiluve trop élevé Manque de point d'eau à proximité
Facilité d'entretien		Evacuation facile des solutions utilisées	Manque de bouchon d'évacuation Pas d'évacuation directe dans la fosse et risque de stagnation des produits évacués Poids du pédiluve trop élevé Matériau du pédiluve difficile à nettoyer
Propreté du sol avant et après pédiluve		Sols propres et secs	Défaut de nettoyage des sols Blocage des animaux avant le pédiluve Blocage des animaux après le pédiluve

Min : minimum ; *rayer les mentions improbables

Entretien avec l'éleveur

Qualité de la réalisation de la désinfection collective			
Critères	Observé	Objectif	Remarques
Nettoyage avant traitement		Nettoyage automatisé ou au jet d'eau moyenne pression en salle de traite avant nettoyage des trayons ou après branchement du faisceau trayeurs sur la mamelle	
Produit utilisé*		Désinfectant ayant montré une certaine efficacité contre la DD	
Concentration de la solution désinfectante		Dosage précis pour aboutir à la concentration recommandée	
Homogénéisation de la solution avant application		Oui	
Régime d'application		Au moins pendant 2 jours tous les 15 jours	
Pédiluve : renouvellement de la solution		< 150-200 passages	
Pulvérisation collective : interférence avec la traite		Non : désinfection réalisée en dehors de la traite ou lors de la traite par une personne dédiée à la désinfection	
Suivi du traitement		Enregistrement des dates d'application	

* cf. [Référentiel « Produits disponibles pour lutter contre la dermatite digitée »](#)

Bilan de la qualité des mesures médicales : traitements individuels contre la dermatite digitée et désinfection des pieds des bovins

Pour les traitements individuels, se référer au *Questionnaire d'investigation de la qualité de la détection et des traitements individuels réalisés par l'éleveur contre la DD.*

<p>Hierarchisation des défauts observés (du plus au moins important)</p>	
<p>Recommandations à court-terme</p>	
<p>Recommandations à moyen ou long-terme</p>	