


RETOURS SUR LES ESSAIS ZOOTECHNIQUES MENÉS EN STATION !




VACHES LAITIÈRES

- Combiner pâturage et fourrages à l'auge : résultats techniques et technico-économiques de 4 ans de suivis à Derval (44)
- 60 % sur le coût alimentaire en 100 % pâturage




CHÈVRES


- Analyse descriptive de la production laitière permise lors d'essais analytiques sur du pâturage caprin, sur de la prairie multi espèces et de la prairie de graminées avec 2 niveaux de complémentation azotée




> Pâturage de prairies de graminées



Production laitière moyenne quotidienne
— Mono haut azote → 4,05 kg
— Mono bas azote → 3,66 kg



> Pâturage de prairies multiespèces



Production laitière moyenne quotidienne
— Mono haut azote → 3,91 kg
— Mono bas azote → 3,76 kg



VACHES ALLAITANTES

- Le parc stabilisé d'hivernage : une innovation pour la conduite hivernale en plein air des troupeaux allaitants.

Evolution de la dégradation d'une parcelle utilisée pour l'hivernage des bovins au cours des deux hivers successifs dans trois contextes pédoclimatiques

Site (Département)	Jalogny (71)		Les Vaseix (87)		Laqueuille (63)	
Hiver	10/11	11/12	10/11	11/12	10/11	11/12
Surface utilisée (ha)	3,7		3,3		4,1	
Chargement (Anx/ha)	3,2		3,3		2,0	
Durée de stationnement (j)	116		92		80	
Surface Dégradée (%)						
Début d'hivernage	9	6	3	6	10	6
fin d'hivernage	15	12	42	41	13	8

(Programme Casdar Salinov 2012)

Une surface dégradée limitée avec une bonne récupération aux saisons suivantes

Effet du mode de conduite du pâturage de bovins allaitants et de la gestion de l'affouragement en hiver sur l'évolution de la dégradation des parcelles

Hiver	1999-2000		2000-2001	
	%	Ha	%	Ha
Pâturage continu				
Râtelier Fixe	2,3	0,32	2,1	0,23
Râtelier mobile	20	0,84	17,4	0,67
Pâturage tournant				
Râtelier fixe	1,6	0,06	2,6	0,08
Râtelier mobile	0,2	0,01	0,1	0,01



(Acta 98/00 Enquête en Limousin)

MOUTON


- Pâturages cellulaire en brebis : les résultats 2014-2015

De l'herbe en plus, du concentré en moins

- RENDEMENT DES PRAIRIES : + 5 à 7 % par rapport aux parcelles conduites en pâturage tournant « classique »
- MOINS DE CONCENTRÉS : 18 %
- MOINS DE FOURRAGES STOCKÉS : 59 % par rapport à une conduite en pâturage tournant « classique »



QUANTITÉS D'ALIMENTS CONSOMMÉES EN 2014 ET 2015 PAR KG DE CARCASSE PRODUITS



Des résultats zootechniques contrastés

Des écarts de productivité numérique entre 2014 et 2015
La productivité numérique est le nombre d'agneaux vendus ou conservés pour le renouvellement, divisé par le nombre de brebis mises à la reproduction.

2014		2015	
Pâturage cellulaire	Pâturage tournant	Pâturage cellulaire	Pâturage tournant
146 %	104 %	100 %	135 %

Le CIRPO

