



# « Objectif : 3 mois de vêlages »

Marie-Françoise ROUYERE à Lachaussée du Bois d'Écu (60)

### POURQUOI LE VÊLAGE GROUPE ?

« Les vêlages ont toujours été groupés, même du temps de mes parents... ».

« Quand on a que 30 vaches, il vaut mieux regrouper pour plusieurs points : la surveillance les vêlages, l'adoption des veaux, la surveillance des buvées, les soins des nombrils, la gestion des lots. Quand les veaux ont le même âge, c'est moins facile pour les gros veaux d'aller voler aux autres mères.

Pour l'allotement en prairies, c'est plus simple car on sait qu'à partir de telle date, il faut séparer les broutards mâles des femelles.

Je trouve ensuite que pour alloter les taurillons, c'est plus simple car ils ont tous sensiblement le même âge ».

### LES POINTS DE VIGILANCE

#### Sanitaire

« Lors de la première période de vêlage, il n'y a pas de soucis sanitaires. Les problèmes arrivent en fin de seconde période quand les nouveaux nés côtoient les premiers veaux nés ».

#### Fatigue de l'éleveur

« Durant la période de vêlage, la fatigue peut s'accumuler. Il faut essayer d'avoir une solution de remplacement quand il y a eu plusieurs vêlages dans la nuit ».

#### Un taureau en forme

« Il faut un taureau en pleine forme au moment des saillies car il n'a pas le temps de se reposer entre deux... ».

### EN PRATIQUE

#### Le choix de la période de vêlage


Le choix de la période de vêlage détermine la période de la mise en reproduction. Pour la race charolaise, il faut compter 287 jours de gestation.

#### Surveillance des chaleurs avant la mise en reproduction

Je surveille les chaleurs le soir et les notes sur « l'écho planning ». Cela me permet de mieux surveiller les cycles de reproduction.

#### Les génisses en reproduction 42 jours avant les vaches

Je mets les génisses au taureau 42 jours avant les vaches (2 cycles) pour éviter que les primipares arrivent en fin de période de vêlage.



#### Surveillance des chaleurs en continu

Durant toute la période de reproduction, je continue à surveiller les chaleurs et noter les saillies. Je veux connaître les dates présumées de vêlage.

#### Maîtrise de la période de reproduction

Les femelles sont toutes échographiées 4 mois après la mise au taureau. Les femelles déclarées vides, ou pleines de moins d'un mois, sont mises à l'engraissement.



Sur ce document sont notées, par vache, à la fois : les dates de détection des chaleurs et prévisionnel de retour en chaleur, la date d'entrée et de sortie du taureau dans le troupeau, les dates prévisionnelles de vêlage confirmées par l'échographie.

### Progrès génétique impacté

« Le choix de grouper les vêlages nous contraint à garder les femelles qui remplissent facilement, au détriment de la valeur génétique de celles-ci... ».

### Monte naturelle préférée

« Les chaleurs des femelles sont mieux détectées par le taureau que par nous-mêmes. L'insémination, vecteur de sélection génétique, est difficilement envisageable à 100% pour maintenir les vêlages groupés... »

### SI C'ÉTAIT A REFAIRE

« Je mettrais un deuxième taureau pour réduire encore la période de vêlage à 1 mois et demi, voire 2 mois... ».

### UN CONSEIL A UN ELEVEUR

« Ne jamais faire de sentiments avec les femelles qui se décalent ou qui ne remplissent pas, c'est une erreur économique... ».

## IMPACTS

### Travail

Une gestion de troupeau plus facile au quotidien.  
Le temps de travail est optimisé.

### Coût alimentaire

La ration est adaptée aux besoins des animaux.  
La complémentation des broutards est aussi facilitée.

### Qualité de vie

La période de surveillance est maîtrisée. Une fois les vêlages terminés, on peut penser à autre chose.

### Maladie des veaux

La surveillance sur une courte période est propice à la surveillance des veaux.

## L'EXPLOITATION EN BREF

Main-d'œuvre	2 UMO
SAU	163 ha dont 34 ha de SFP
Troupeau	30 vaches charolaises 15 jeunes bovins

