


## De l'herbe et des brebis en bon état cet automne

L'herbe est plutôt abondante cet automne et affiche une valeur alimentaire équivalente à celle d'un aliment complet. Les conditions sont idéales pour prolonger le pâturage de l'ensemble du troupeau pendant plusieurs semaines.

### HAUTEURS D'HERBE À LA FIN OCTOBRE : LA MÊME DISPONIBILITÉ QU'EN 2014



Source : CIIRPO, site du Mourier

### Des agnelles luttées à 47 kg minimum

La durée de la saison sexuelle des agnelles est courte : en général, de septembre à décembre. Une durée de lutte de deux cycles, soit 34 à 40 jours maximum, limite le taux de mortalité des agneaux à l'agnelage et simplifie le travail. Mais pour obtenir au moins 90 % de fertilité, plusieurs conditions doivent être réunies :

- Un poids minimum à la mise à la reproduction : 47 kg pour les races lourdes utilisées en France, soit les deux tiers du poids adulte, reste la référence. Pour les agnelles n'atteignant pas ce poids plancher, le taux de fertilité est en effet inférieur de 33 %.
- Des béliers suffisamment nombreux et expérimentés : le ratio recommandé est d'un mâle pour 25 agnelles car contrairement aux brebis adultes qui tournent autour du bélier quand elles sont en chaleurs, les agnelles s'enfuient. Pour cette raison, il est préférable d'assurer les luttes avec des béliers expérimentés. La lutte avec plusieurs béliers est toujours préférable lorsque cela est possible. La compétition entre les mâles est en effet toujours bénéfique.
- Des luttes à part des adultes : parce que les béliers préfèrent les brebis expérimentées qui sont peu farouches, lutter les agnelles à part est indispensable.

Une agnelle continue à avoir des besoins de croissance en plus de ceux de gestation. En maintenant un niveau d'alimentation soutenu jusqu'à la mise bas, l'agnelle sera suffisamment développée à l'agnelage. Elle aura ainsi toutes les chances de devenir une bonne brebis !



### UNE BONNE UTILISATION DU HARAS DE BÉLIERS

ÂGE DES BÉLIERS	DESTINATION
Agneau de moins d'un an	Ne pas mettre en lutte (en croissance)
Antenais : un à deux ans	Brebis adultes en priorité
Adulte : 3 à 5 ans	Agnelles ou brebis adultes
Plus de 5 ans	Vente pour la réforme

Pour assurer le renouvellement, 25 % du haras est acheté chaque année en jeunes béliers. Des béliers peuvent être infertiles et en cas de lutte en paternité, les repasses doivent être assurées avec un autre bélier



## - PROCHAINEMENT -

Deux nouvelles vidéos seront bientôt disponibles sur [www.idele.fr](http://www.idele.fr) et [www.inn-ovin.fr](http://www.inn-ovin.fr) :

En octobre :

- Des luttres d'automne courtes et réussies pour les brebis.

En novembre :

- Des luttres naturelles réussies pour les agnelles.

## Parasitisme : toujours de l'haemonchose !

Les pluies de fin d'été et début d'automne ont permis les repousses d'herbe tant attendues mais cette situation est également favorable à la reprise d'activité des cycles larvaires des strongles gastro intestinaux. Ainsi, il convient de rester attentif en particulier aux infestations de strongles de la caillette en ce milieu d'automne. Des foies présentant de la Grande Douve ont été saisis ces dernières semaines en abattoir. Pour ces deux parasites, l'observation des animaux (animal à la traîne ; couleur de la troisième paupière d'un animal malade...) permet de détecter des signes précurseurs. Pour les autres strongles digestifs et la Petite Douve, l'analyse des crottes par coproscopie reste particulièrement efficace en cette saison.

## Des fins de gestation à l'herbe

Jusqu'à la fin du mois de novembre, les quantités d'herbe devraient être suffisantes pour les brebis en fin de gestation. Les brebis gestantes de simples couvrent leurs besoins avec cette unique ration et peuvent rentrer en bergerie quelques jours avant les premières mise bas. Par contre, un apport de l'ordre de 500 g de céréales par brebis et par jour reste nécessaire pour les brebis à l'herbe porteuses de doubles et triples au cours des quatre dernières semaines de gestation. S'il y a de la place en bergerie, il peut être judicieux de les rentrer une dizaine de jours avant l'agnelage pour réaliser une transition alimentaire. Afin de supprimer les carences en sélénium qui se manifestent en particulier par la « maladie du raide chez l'agneau », la distribution d'un Aliment Minéral Vitaminé (AMV) au cours du dernier mois de gestation est particulièrement efficace. Sachant que les besoins d'une brebis sont de 0,4 mg par brebis, il suffit de choisir un AMV qui dose 20 mg de sélénium par kg et de le distribuer à raison de 20 g par brebis et par jour (lire les recommandations sur l'étiquette). Votre technicien peut vous aider à ajuster vos rations.

## Des agneaux à vendre pour Noël et Pâques

Pour vendre des agneaux à Noël cette année, il faut prévoir de les faire partir le 18 décembre au maximum, le temps qu'ils arrivent jusqu'aux consommateurs. Pour Pâques, la date limite est le 18 mars 2016. Selon les dates d'agnelage, il peut être utile d'anticiper la conduite des agneaux. Pour ne pas perdre de temps au cours de la période de finition, il est judicieux de sevrer les agneaux aux premiers départs. D'autre part, si le rationnement favorise les carcasses de bonne qualité (quantité et qualités du gras), il majore également la durée de finition d'une quinzaine de jours pour un niveau de rationnement de l'ordre d'un kg par animal et par jour.



Pour en savoir plus, contactez votre technicien.  
Des informations sont également en ligne  
sur les sites : [www.inn-ovin.fr](http://www.inn-ovin.fr) et [www.idele.fr](http://www.idele.fr)

...PROCHAINE LETTRE D'INFORMATION  
EN FÉVRIER 2016

Document réalisé par des techniciens d'organisations de producteurs et de chambres d'agriculture des régions Limousin, Poitou-Charentes et Centre.

Membres du comité de rédaction de cette lettre : Nathalie Augas (Chambre d'agriculture 16), Odile Brodin (Chambre d'agriculture 18), Gilles Chesterman (OBL), Nathalie Lebraud (Chambre d'agriculture 87), Danièle Sennepin (Chambre d'agriculture 23).  
Coordonné et rédigé par Laurence Sagot (Institut de l'Élevage/CIIRPO).

Avec le soutien financier de :

