



La gestion des boiteries des bovins

15/09/2026

Aurore Duvauchelle Waché (Institut de l'Elevage)

Pierre Chambard (CFPPA du Rheu)


Morgan Longé (Formateur pédicures bovins CFPPA du Rheu)



ELIANCE
Des éleveurs. Une ambition.



Les boiteries, est-ce si important en élevages bovins ?



Bien-être animal :
inconfort, douleur




Temps de travail et charge
mentale pour l'éleveur




Pertes économiques

De $\approx 69\text{€}$ à $\approx 483\text{€}$ par cas (Dolecheck et. al, 2018)
 Ulcère de la sole : de $\approx 210\text{€}$ à $\approx 971\text{€}$ (Dolecheck et. al, 2018)
 Ouverture de la ligne blanche: de $\approx 200\text{€}$ à 534€/cas
 (Dolecheck et. al, 2018)
 Dermatite digitale active : $391,80\text{€/cas}$ (Robcis et al. 2023)



(Dolecheck et Bewley, 2018)



Quelles sont les causes de boiteries chez les bovins ?

90% des boiteries sont
d'origine podale

26 lésions podales
répertoriées chez les
bovins

Lésions de la peau

Lésions de la corne



Comment maîtriser les boiteries ?

Maîtrise
durable des
boiteries

Comment maîtriser les boiteries ?




Identifier les vaches
boiteuses

Maîtrise
durable des
boiteries

Identifier les vaches boiteuses

Des indicateurs à observer REGULIEREMENT

En statique



En dynamique

Type de note	Note	Description du comportement de la vache	Action suggérée
Démarche saine 	0	Marche avec le même appui et le même rythme sur les 4 pieds, avec un dos droit. pas longs et fluides possibles	• Pas d'action nécessaire. • Parage de routine (préventif) quand/si nécessaire. • Enregistrement de la démarche lors de la prochaine session de notation.
Démarche légèrement anormale 	1	Pas irrégulier (rythme ou appui) ou pas raccourcis ; membre(s) atteint(s) non identifiable immédiatement.	• Pourrait bénéficier d'un parage de routine (préventif) quand/si nécessaire. • Observations de la démarche ultérieures recommandées.
Boiterie modérée 	2	Répartition inégale du poids sur un membre immédiatement identifiable et/ou pas clairement raccourcis (habituellement avec le dos courbé en son milieu)	• Boiteuse et nécessitant très probablement un traitement. • Le pied devrait être levé pour établir la cause de la boiterie avant de traiter. • S'occuper de cette vache aussi vite que possible (< 48 h).
Boiterie sévère 	3	Incapable de se déplacer à vive allure (n'arrive pas à suivre troupeau sain). Membre boiteux facile à identifier ; a du mal à s'appuyer sur le(s) membre(s) atteint ; dos courbé au repos et en mouvement.	• Cette vache boite sérieusement et nécessite une prise en charge urgente, des soins et des conseils professionnels. • À examiner au plus vite (< 24 h). • Doit bénéficier d'un traitement. • Ne devrait pas à avoir à marcher sur de longues distances et devrait être maintenue en aire paillée ou en pâture. • Pour les cas les plus sévères, la réforme peut être la seule solution possible.

Comment maîtriser les boiteries ?

Identifier les vaches
boiteuses

Maîtrise
durable des
boiteries

Lever les pieds
des vaches


Lever les pieds des vaches

Différents systèmes


En 10 min

En sécurité pour l'animal

En sécurité pour l'intervenant




Comment maîtriser les boiteries ?



Traitements parfois différents

Facteurs de risque parfois différents

Comment maîtriser les boiteries ?




Traiter de manière adaptée


**Pas d'injection
d'antibiotiques en 1^e
intention
sauf panaris**

Traitement individuel :
Parage
Pansement
Talonnette
Désinfectant...

Traitement collectif :
Pédiluve
Pulvérisation ...



Comment maîtriser les boiteries ?



Précocité

La précocité du dépistage et d'intervention sont essentielles

Parage moins de 14 jours après
détection de la boiterie

→ 69% de guérison 1 mois
après parage

(Thomas et al 2015)

VS

Parage > 1 mois après
détection de la boiterie

→ 15% de guérison 1 mois
après parage

(Thomas et al 2016)






Pourtant : Une détection et une prise en charge en moyenne beaucoup trop tardive

- Retard de 21 jours pour des vaches sévèrement boiteuses (Alawneh et al 2012)
- Retard de 70 jours pour les boiteries « légères » (Alawneh et al 2012)
- Retard de traitement moyen de 38 jours (Groenevelt et al 2014)

Comment maîtriser les boiteries ?



Identifier et maîtriser
les facteurs de risque

Boiteries
=
Multifactorielles

Animal

Age, production, comportement,
génétique



Gestion sanitaire

Détection, prévention,
traitement



Habitat

Logement, sol, temps debout,
hygiène, pâturage




Alimentation

Etat corporel, état des bouses,
qualité de la corne



Comment maîtriser les boiteries ?



Parage

Par lots

- Avant tarissement : 0 boiterie pendant le tarissement pour une bonne future lactation
→ Parage 4 à 6 semaines avant tarissement.
- Après vêlage : limiter impact sur les pieds des maladies post vêlage et maintien de la lactation
→ Parage entre 40 et 70 à 80 jours de lactation.
- Animaux boiteux et sub-boiteux.

Gagnants = éleveur, animaux, intervenant !

Un travail collaboratif





Faut-il être formé pour parer les pieds des bovins ?

- Oui !
 - Parage = acte précis et délicat
 - Un mauvais parage peut aggraver les lésions et leurs conséquences
- Intervenants formés au parage des bovins et pouvant intervenir sur tous les troupeaux :
 - Vétérinaires : formation en écoles vétérinaires
 - Pareurs bovins : formation diplômante au CFPPA du Rheu
- Eleveurs formés : intervention sur leur propre troupeau.

MESSAGES CLES

- Importance de la prévention
→ **Gestion par lots**
- Détection précoce des vaches boiteuses
- Prise en charge précoce des vaches boiteuses par une personne formée

« Un travail par lot fait par quelqu'un qui maîtrise les gestes parfaitement aura un meilleur résultat dans les élevages »





Formation au parage des bovins

Pierre Chambard (CFPPA du Rheu)

Qu'est ce que la formation « pédicure pour bovins » proposée par le CFPPA Rennes/ Le Rheu ?



LE PARCOURS 440 h en centre, en alternance

90 h
(13 jours)

BLOC 1 · Gestion et organisation (à Distance)

Réglementation du métier, projet d'entreprise, relation client. En FOAD + entreprise.

Par qui ? Des pédicures experts salariés et indépendants - Vétérinaire

245 h
(35 jours)

BLOC 2 · Parage fonctionnel et curatif

Le cœur du métier : anatomie, lésions, contention, affûtage, sécurité. TP en élevages.

Par qui ? Des pédicures experts salariés et indépendants - Vétérinaire

105 h
(15 jours)

BLOC 3 · Diagnostic des boiteries

Approche globale du troupeau : alimentation, bâtiment, conduite d'élevage.

Par qui ? Des pédicures experts salariés et indépendants - Vétérinaire

À LA CLÉ

Diplôme

- Inscrit au RNCP depuis juin 2020
- 3 blocs de compétences acquis à vie
- Évaluation en situation professionnelle réelle
- Deux sessions par épreuve : droit au rattrapage

PROMOTION 2026-2027

28 sept. 2026

au

4 juin 2027

SE FORMER EN 3 LIEUX

CFPPA du Rheu

Formateurs-riche-s pédicures en exercice + un vétérinaire spécialiste des boiteries



Entreprise d'accueil

Un tuteur de profession, en apprentissage ou en contrat



FEST (Formation en situation de travail)

Semaines de formation en situation de travail, avec un moniteur agréé par le centre de formation



Témoignage de Morgan LONGÉ

Pédicure pour bovins et formateur de pédicures pour bovins au
CFPPA Rennes/Le Rheu



Pour plus d'informations sur la formation « pédicures pour bovins »

02 99 60 87 77

cfppa.le-rheu@educagri.fr



Ressources

Maîtrise des boiteries dans les troupeaux bovins laitiers

Description de la méthode
et des facteurs de risque

+

Documents de référence

+

Documents de collecte



Site internet

www.boiteries-des-bovins.fr

LE PIED EST AUSSI IMPORTANT
QUE LA MAMELLE !
PRENEZ-EN SOIN AU QUOTIDIEN !



Merci de votre attention



ELIANCE
Des éleveurs. Une ambition.



France
Votre expert en hygiène



Retrouvez les diaporamas de nos conférences
sur **idele.fr**



Venez échanger avec nos ingénieurs
sur notre

stand B08 (Hall 6)

