INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Webinaire InnOvin

S'organiser pour l'agnelage

Le 12 novembre 2026

Valérie Wolgust (vétérinaire), Stéphane Pype,
Laurent Solas (Chambre d'agriculture de Saône et Loire)

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

A votre avis, quel est le plus important pour une bonne organisation de l'agnelage?

FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
GDS France
FBL France Brebis Laitière

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Au programme



Les préalables



Une ration sur mesure en fin de gestation



Une organisation pour faciliter le travail



Une pharmacie prête et à portée de main



Intervenir à bon escient

FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
GDS France
FBL France Brebis Laitière

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Les préalables

- Planifier les agnelages
- Des **luttes courtes** : 35 jours en automne ; 51 jours au printemps et la première moitié de l'été (ou béliers vasectomisés 14 jours + 35 jours)
- Des **constats de gestation** : 45 jours après la fin de la lutte
- Une ration plus **riche 6 semaines** avant la mise-bas

FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
GDS France
FBL France Brebis Laitière

Les préalables

- Des brebis **sans parasites** et vaccinées si nécessaire



- Des brebis **en bon état**





Les préalables

- Une **bergerie curée,** propre et confortable



INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Une ration sur mesure en fin de gestation




FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
GDS France
FBL France Brebis Laitière

Une ration sur mesure en fin de gestation

Les caractéristiques des brebis en fin de gestation

- Une augmentation des besoins en énergie, azote et minéraux

- Une diminution de la capacité d'ingestion



A partir de 6 semaines avant la mise-bas

Une ration sur mesure en fin de gestation

- Les besoins pour des brebis de 70 kg

SIMPLE

	UFL	PDI
Milieu de gestation	0,8	61 g
Fin de gestation semaines -4 à -3	1,02	114 g
Fin de gestation semaines -2 à -1	1,22	129 g

DOUBLE

	UFL	PDI
Milieu de gestation	0,8	61 g
Fin de gestation semaines -4 à -3	1,14	146 g
Fin de gestation semaines -2 à -1	1,5	172 g

Source : INRA 2007

Une ration sur mesure en fin de gestation

- Un déficit alimentaire augmenté de 20 % les 6 dernières semaines de gestation, c'est **300 g de concentré de moins** par brebis et par jour



▶ **+ 9%** d'agnelage difficile



▶ **- 690g** poids à la naissance

Mortalité : +6,2%



▶ **- 29%** d'agneaux autonomes et très actifs



▶ **+ 6%** d'agneaux en difficulté après l'agnelage



▶ **+ 19%** d'agneaux qui n'apprennent pas à téter facilement

Une ration sur mesure en fin de gestation

Vérifier l'efficacité de la ration

Le poids des agneaux à la naissance :
Simple : 5 kg
Double : 4 kg
Triple : 3,5 kg





L'état des brebis après la mise-bas :
Au moins 2,5

Une ration sur mesure en fin de gestation

- Une attention particulière aux **minéraux et vitamines**

- Une prévention contre les **toxémies** de gestation

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Une organisation pour faciliter le travail



FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
GDS France
FBL France Brebis Laitière

Une organisation pour faciliter le travail

En bergerie

- Nombre de cases individuelles d'agnelage pour un passage systématique en case d'agnelage de toutes les brebis et un temps de séjour de 48 h

Type de femelles	Nombre de cases
Lutte naturelle	20 % du lot
Lutte synchronisée	50 % du lot
Agnelles en lutte naturelle	30 % du lot

Source : réseau des spécialistes Inn'Ovin

Une organisation pour faciliter le travail

En bergerie

- Les profondeurs de parcs

Catégorie d'animaux	Profondeur minimum d'aire paillée
Brebis en fin de gestation et lactation avec les cases d'agnelage	6 m
Brebis en fin de gestation et lactation sans les cases d'agnelage	5 m

Source : réseau des spécialistes Inn'Ovin

Une organisation pour faciliter le travail

En bergerie

- Les surfaces d'aire paillée

Format des brebis	Moyen	Grand
Brebis vide ou en gestation	1,2 m²	1,5 m²
Brebis allaitante avec un agneau	1,5 m²	
Brebis allaitantes avec deux agneaux*	2 m²	

Source : réseau des spécialistes Inn'Ovin

Une organisation pour faciliter le travail

Pas UNE mais DES façons de faire

Une organisation pour faciliter le travail

Différents emplacements de cases d'agnelage



Au bord d'un couloir de 1,2 m de large



Sur l'aire paillée côté bardage




Accolées à l'auge



Dans un espace dédié


Une organisation pour faciliter le travail

Différents emplacements des cases d'agnelage




Une organisation pour faciliter le travail

Différents emplacements des cases d'agnelage



Une organisation pour faciliter le travail

Différents emplacements des cases d'agnelage



Une organisation pour faciliter le travail

Les équipements dans les cases d'agnelage



Abreuvoir

Une brebis en case boit 10 litres d'eau par jour






Augette

Fourrage et concentré

Concentré seulement

Une organisation pour faciliter le travail

A la rentrée en cases d'agnelage



Une organisation pour faciliter le travail

Des cases de pré-lâchés

Des marques par famille



Des marques par lot



Une organisation pour faciliter le travail

- **A l'herbe**
  - Des brebis en **grands lots** en pâturage continu
  - Des brebis en **petits lots** en pâturage continu
  - Des brebis séparées selon la **taille de la portée** en pâturage tournant dynamique

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Une pharmacie prête et à portée de main



FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
GDS France
FBL France Brebis Laitière

Une pharmacie prête et à portée de main

Spécial agnelage : le petit matériel

- Gants à usage unique
- Cordelettes ou lasso agnelage
- Biberons et tétines
- Lampe chauffante / sèche-cheveux
- Pélican
- Anneau de gomme + pince
- Boucles



Une pharmacie prête et à portée de main

Spécial agnelage : les produits

- Gel obstétrical ou savon
- Sucre rapide (miel ou sérum glucosé)
- Soluté calcique (brebis en hypo)
- Désinfectant asséchant pour les nombrils et pour les boucles
- Analeptique cardio-respiratoire
- Antibiotiques à base de pénicilline et d'oxytétracycline
- Sélénium si risque de carence
- Réserve de colostrum ou sachets de colostro-remplaceur



À voir avec le vétérinaire traitant dans le cadre du protocole de soins

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Une pharmacie prête et à portée de main



La pharmacie de base :

- Désinfectant / savon
- Thermomètre
- Aiguilles et seringues à usage unique (tailles différentes / âge)
- Gants jetables (grands et petits)
- Bandes plâtrées
- Compresses stériles
- Répulsif à mouches
- Pince à épiler
- Couteau, scalpel
- Pessaire ou harnais
- Antibiotiques retard
- Anti-inflammatoires
- Anti-hémorragique
- Bombe cicatrisante
- Pommade oculaire
- Huile

FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE · interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE · Confédération Nationale de l'Elevage CNE · LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE · INSTITUT DE L'ELEVAGE idele · RACES DE FRANCE · CHAMBRES D'AGRICULTURE · Jeunes Agriculteurs · GDS France · FBL France Brebis Laitière

Le colostrum

Pour se comprendre avec des éleveurs laitiers

- Lait de 1e traite, vache non tétée. OK
- Lait de pot des 7 premiers jours. NON

Peser son colostrum, comment?



	Pèse colostrum	Refractomètre
Colostrum type	Bovin, à congeler	Brebis fraichement suitée
Avantage	Simple à utiliser	1 goutte suffit
Problème principal	Nécessite un gros volume	Lecture à prendre en main
Colostrum correct	vert	> 24 brix
Colostrum à jeter	rouge si bovin (<50g/L) 2e case orange et rouge si ovin (<75g/L)	< 17 brix si vache < 20 brix si brebis





Dr DANIEL Delphine, vétérinaire Alliance Pastorale

Intervenir à bon escient

La règle des trois 30

Il faut intervenir si :

- Depuis **30 mn** : la poche des eaux est visible,
- Depuis **30 mn** : l'agneau semble en position normale mais la mise-bas n'avance pas,
- Depuis **30 mn** : le premier agneau est né et le jumeau n'apparaît pas.






LES PRINCIPALES PRÉSENTATIONS DE L'AGNEAU À L'AGNELAGE

LES DEUX PRÉSENTATIONS NORMALES DE L'AGNEAU

À gauche, la plus fréquente par les pattes avant,
À droite, par les pattes arrière (l'agneau peut être sur le ventre ou sur le dos).






LA RÈGLE DES 3 X 30
POUR SAVOIR QUAND INTERVENIR

- Depuis 30 mn : la poche des eaux est visible,
- Depuis 30 mn : l'agneau semble en position normale mais la mise bas n'avance pas,
- Depuis 30 mn : le premier agneau est né et le jumeau n'apparaît pas.

D'autres infos sont disponibles en ligne


Rédaction : Laurence Sagot (Idele/CIIRPO) et Pierre Autef (vétérinaire).
Avec le soutien financier de :

SEPT POSITIONS QUI DEMANDENT SOUVENT UNE INTERVENTION



La tête et l'une des pattes avant sont extériorisées

- S'il est possible de rentrer la tête, sortez une patte puis l'autre en longeant les épaules,
- S'il n'est pas possible de rentrer la tête, gardez la position « en crawl ». Tirez sur la patte avant de l'agneau. Avec l'autre main, positionnez l'autre épaule en appuyant sur l'articulation.




La tête est extériorisée, les pattes avant sont pliées

- S'il est possible de rentrer la tête, sortez une patte puis l'autre en longeant les épaules,
- S'il n'est pas possible de rentrer la tête, attrapez une patte en longeant une épaule. Sortez l'agneau en position « crawl ».




La tête est retournée, les pattes avant sont bien positionnées

Repoussez l'agneau et ramenez la tête dans la bonne position en la penchant sur un côté. Puis, tirez sur les pattes en s'assurant que la tête est bien engagée.



La tête se présente par la nuque, les pattes avant sont bien positionnées

Repoussez l'agneau. Ramenez la tête dans la bonne position en passant les doigts sous le menton. Puis tirez sur les pattes en s'assurant que la tête et bien engagée.



L'agneau est en siège

Repousser l'agneau. Dépliez complètement les pattes arrière avant de sortir l'agneau (en deux étapes en passant par la position accroupie). Attention à bien positionner la queue dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si elle est retournée vers l'avant, une déchirure utérine est possible.



Torsion utérine

Il n'y a pas eu de poche d'eau visible.
À l'examen, on a une sensation de sac qui serait fermé et tordu. Seule une césarienne permet de sauver l'agneau dans la grande majorité des cas.


Les agneaux sont emmêlés

- Pour comprendre la situation, repoussez les membres extériorisés,
- Commencez par identifier une tête. Puis longez les épaules pour identifier une et les deux pattes. Sortez-les. L'agneau peut également être mis au monde en position « crawl ». Si une queue ou une patte arrière est identifiée, longez la cuisse pour identifier la seconde puis les dépliez complètement avant de sortir l'agneau.




CINQ ASTUCES POUR FACILITER LA MISE BAS

1. **Lubrifier** lors d'une mise bas difficile.
2. **Si le col n'est pas dilaté,** le masser doucement avec les doigts. Les injections d'ocytocine et de calcium facilitent l'intervention à condition de pouvoir passer deux doigts.
3. **Pour reconnaître les pattes avant des pattes arrière,** suivre la patte et ses articulations : une patte avant forme un U ; une patte arrière un Z.
4. **Pour une meilleure préhension des pattes,** utiliser de la « ficelle bleue » nouée juste au-dessus du sabot.
5. **Pour faciliter la naissance,** mettre deux doigts dans l'anus de la brebis pour passer derrière le haut de la tête de l'agneau puis l'accompagner pour la sortir.



↑ Différenciation des pattes



↑ Utilisation de la ficelle bleue