


Parasitisme : les bons réflexes pour garder une longueur d'avance sur les strongles

DIAGNOSTIQUER ET TRAITER

AUGMENTER LA RÉSISTANCE ET LA RÉSILIENCE

- Conduite des chevrettes **séparément** des adultes
- Solutions à base de plante **ne remplacent pas** un traitement anthelminthique
- Sélection d'**animaux résistants** : une solution d'avenir




- Temps de retour > **90 jours**
- **Rupture** de pâturage : fauche et labour
- **Ne pas pâturer** sous 5cm
- Attention aux aires d'exercices **enherbées** ou **parcelles utilisées régulièrement** proches du bâtiment

LIMITER LES INFESTATIONS

Retrouvez tous les messages clés et outils pour mieux gérer votre parasitisme dès 2027 sur <https://idele.fr/eco-agir/>

- Attention à l'introduction de **parasites résistants** lors de l'achat d'animaux
- Coprologie de mélange à réaliser avec **minimum 10 chèvres**
- **Bonnes pratiques** de prélèvements et d'envoi pour analyse coprologique
- Respecter la **posologie** en se basant sur **l'animal le plus lourd**
- Si possible, **alterner les familles** de molécules
- Vérifier l'**efficacité du traitement** avec une analyse coprologique
- **Proscrire le traitement** avant le **changement de parcelle**
- Peu d'espoir de nouvelle famille de molécules



CONTACTS :

Benoît Desanlis (Ardèche Drôme Isère Conseil Elevage), Alban Scappaticci (GDS des Savoie), Sophie Jouffroy (FiBL France), Léa Bordes (IDELE), Caroline Sauvageot (IDELE)