

Le contexte : des agnelages souvent fractionnés

- **Pour écrêter les pointes de travail**

Surveillance des agnelages : pic de travail d'astreinte en ovin viande

- **Pour étaler les ventes d'agneaux**

Facilite la gestion de la trésorerie et l'approvisionnement des démarches qualité

- **Pour économiser de la surface en bâtiments**

La rotation des lots d'agnelage permet d'augmenter leur taux d'occupation et de les rentabiliser



Avec quelques inconvénients

- **Augmentation de la durée annuelle de travail d'astreinte**
On passe moins de temps pour un lot de 100 mises base que pour deux lots de 50
- **Gestion du renouvellement plus compliquée**
Obligation de prélever des agnelles sur plusieurs lots, avec des âges très différents à la mise en lutte
- **Gestion du pâturage plus compliquée**
Plus de lots à surveiller
- **Dégradation de l'ambiance dans les bâtiments**
Absence de réel vide sanitaire

Le retour à des pratiques plus simples

- **Moyenne des éleveurs du Réseau ovin Centre-Ouest**

Agnelages étalés sur 5 à 6 mois

+/- 100 mises bas gérées /mois et/UMO consacrée à l'atelier ovin

- **Le quart qui concentre le plus les agnelages**

Agnelages sur 3 mois au maximum

Pics de l'ordre de 200 mises bas/mois et /UMO consacrée à l'atelier ovin



Le GAEC du Trançon (Alloue, Charente)

- **3 UMO**

Alexandre et Nadine Boutant, associés en GAEC

Un salarié

- **187 ha de SAU**

172 ha de SFP dont 30 ha de prairies permanentes

15 ha de céréales autoconsommées

- **2 troupeaux allaitants**

875 brebis croisées

43 vaches allaitantes, Limousines en système naisseur

Arrêt de la contre-saison

- **Une conduite initiale avec 2 périodes d'agnelage**

- 1^{ère} période d'agnelage d'octobre à décembre, sur synchro et IA, avec production d'agneaux de bergerie
- 2^{ème} période de janvier à mai, en lutte naturelle, avec production d'agneaux d'herbe et finition en bergerie


- **Un nouveau système plus simple**

Unique période de janvier à mai, avec des agneaux nourris en priorité à l'herbe

- **Deux objectifs**

- **Meilleure autonomie alimentaire** : moins d'achat de concentré
- **Moins de travail** : pics de travail moins marqués (cf. lots sur éponges), moins de manipulations (pose et dépose d'éponges, IA), moins d'alimentation en bâtiments

Evolution de la répartition des agnelages



Un système fortement réorganisé

- **Baisse du chargement**

Arrêt du renouvellement interne en génisses, remplacé par l'achat de vaches suitées

- **Des aménagements pour faciliter la gestion du pâturage**

Clôtures, alimentation en eau, implantation de haies

- **Amélioration de la qualité des prairies**

Semis de mélanges plus riches en légumineuses

- **Achat d'un parc de contention mobile**

Limiter les déplacements des animaux et faciliter la réalisation des soins et des tris

Des résultats correspondants aux objectifs

- **Evolution des résultats techniques**

Baisses des consommations de concentré
et de fourrages stockés

Stabilité de la productivité des brebis

- **Perspectives**

Améliorer la gestion de la finition des
agneaux en année sèche :

- implantation de dérobées
- rentrée en bergerie

Année	2020	2023
Chargement (brebis/ha SFPO)	7,5	6,8
Taux de mise bas	89 %	93 %
Taux de prolificité	139 %	137 %
Taux de mortalité	15 %	19 %
Productivité numérique	103 %	99 %
Concentré (kg/brebis)	123	94
Fourrage distribué (kg MS/brebis)	185	118