Webinaire InnOvin

Pallier un manque de fourrages en OVINS VIANDE

Le 2 novembre 2026

Marion Guibert (Natera), Stéphane Pype, Laurent Solas (Chambre d'agriculture de Saône et Loire)

Etat des lieux



Printemps 2026
Des récoltes inférieures de 20 à 70 %



Plusieurs mois d'affouragement




Une repousse hétérogène des prairies



Des prix de la paille et du foin qui flambent

Baisse de récoltes par rapport à une année « normale »



Grand Est
54, 67, 68, 57

Foin : -32%
Enrubannage :-45%
Ensilage : -42%
Paille : -17%

Nord-ouest
76, 50, 27, 14, 61, 60, 02, 80

Foin : -40%
Enrubannge :-10%
Ensilage : -50%
Paille : 0%

Centre-est
43, 63

Foin : -30%
Enrubannage :-12%
Ensilage : -45%
Paille : -17%

Centre-ouest
17, 79, 23, 86

Foin : -45%
Enrubannage :-38%
Ensilage : -50%
Paille : -25%

Sud-est
13, 84, 83, 05, 06

Foin : -50%
Enrubannage :-55%
Ensilage : NC
Paille : -50%

Sud-ouest
81, 46

Foin : -45%
Enrubannage :-30%
Ensilage : -50%
Paille : -40%

Conduite du troupeau : les impondérables



Des constats de gestation



Des réformes sévères



Des brebis bien alimentées



Surveiller le parasitisme



Des analyses de fourrages

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Un bilan fourrager pour prendre les bonnes décisions



1. Comparer les besoins du troupeau aux stocks,
2. Répartir les fourrages par lots d'animaux
3. Calculer les rations

FNO FÉDÉRATION NATIONALE

Jeunes Agriculteurs


GDS France

FBL France Brebis Laitière

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Acheter du foin ou de la paille?

PRIX D'INTÉRÊT DE LA PAILLE ET DU FOIN



Prix retenus pour le calcul :
orge (230 € la tonne),
complémentaire azoté (450 € la tonne)

Source : Réseau des spécialistes InnOvin 2026

FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
GDS France
FBL France Brebis Laitière

Fourrages stockés : les priorités par type d'animaux (1/2)

PRIORITÉS PAR TYPE D'ANIMAUX ET DE FOURRAGES

TYPE D'ANIMAUX	Enrubannage de graminées	Foin ou enrubannage de légumineuses pures	Ensilage d'herbe ou de maïs
Brebis allaitantes	▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪
Brebis en fin de gestation	▪ ▪[1]	▪ ▪[1]	▪ ▪[1]
Brebis à l'entretien	▪	X	▪
Agneaux en finition	X	▪[2]	X
Agnelles de renouvellement	▪	X	▪

FOURRAGE :

▪ ▪ ▪ Préconisé

▪ ▪ Adapté

▪ Possible

X Inadapté

[1] Attention aux prolapsus si fourrage à volonté

[2] Avec diminution ou suppression du complément

Source : Réseau des spécialistes InnOvin 2026

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Fourrages stockés : les priorités par type d'animaux (2/2)

TYPE D'ANIMAUX	Bon foin de graminées	Foin médiocre de graminées	Paille
Brebis allaitantes	▪ ▪ ▪	X	X
Brebis en fin de gestation	▪ ▪[1]	X	X
Brebis à l'entretien	▪	▪ ▪ ▪	▪ ▪
Agneaux en finition	X	▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪
Agnelles de renouvellement	▪	▪ ▪	▪ ▪[3]

FOURRAGE :

- ▪ ▪ ▪ Préconisé
- ▪ ▪ Adapté
- ▪ Possible
- X Inadapté


[1] Attention aux prolapsus si fourrage à volonté
[2] Avec diminution ou suppression du complément
[3] En fonction de poids et de l'âge

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Mise à l'herbe d'automne

Par ordre décroissant de priorité :

- Les femelles en préparation à la lutte
- En lutte (avec transition)
- En milieu de gestation
- Vides
- En fin de gestation



FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
GDS France
FBL France Brebis Laitière

Mise à l'herbe d'automne

Pour évaluer la durée de pâturage :



1. Evaluer la biomasse disponible **:**

- Hauteur d'herbe à consommer : entrée – 5 cm
- (A)Quantité disponible : hauteur d'herbe à consommer x 200 kg x surface à pâturer

2. Calculer les quantités nécessaires pour les brebis :

- (B) 1,7 kg x nombre d'animaux

3. On obtient une durée de pâturage :

- (A)/(B)

Zoom sur le pâturage de la luzerne

Des précautions compte-tenu de son stade feuillu :

- Transition alimentaire,
- Rationnement,
- Ajout d'huile de paraffine à la ration (10 ml par brebis),
- Topping (?)



Pâturer en plus des prairies

Les couverts végétaux	Point clef	Précaution
	Un rendement très variable	Convient à tous les types d'animaux

Pâturer en plus des prairies

Les céréales	Point clef	Précaution
	Le pâturage ne modifie pas le rendement en grains de la culture.	Ne pas faire pâturer au-delà du stade tallage et si le sol n'est pas portant.

Pâturer en plus des prairies

Le colza



Point clef

Le pâturage ne modifie pas le rendement en grains de la culture.


Précaution

Un pâturage d'octobre à décembre avec des colzas parfaitement enracinés,
Une surveillance quotidienne du pâturage en veillant à ce que l'apex ne soit pas consommé.


Pâturer en plus des prairies

Les prairies bovines	Point clef	Précaution
	Le pâturage n'impacte pas la pousse et la qualité de l'herbe au printemps suivant.	Un pâturage jusqu'à fin janvier maximum.

Pâturer en plus des prairies

Les pommeraies	Point clef	Précaution
	Un pâturage de décembre à juillet pour les pommiers hautes tiges, d'octobre à février pour les pommiers palissés.	Une surveillance quotidienne pour que les brebis n'endommagent pas les arbres.

Pâturer en plus des prairies

Les vignes	Point clef	Précaution
	À pâturer de la mi-octobre jusqu'à la mi-mars.	Aménager si possible des espaces en bout de rang pour que les brebis puissent se coucher.


INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE



Les alternatives à la paille de litière

Les plaquettes de bois :

- En pur ou en millefeuilles,
- Les mêmes performances



Source : CIIRPO 2019 - hors temps de travail

FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE · interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE · Confédération Nationale de l'Elevage CNE · LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE · INSTITUT DE L'ELEVAGE idele · RACES DE FRANCE · CHAMBRES D'AGRICULTURE · Jeunes Agriculteurs · GDS France · FBL France Brebis Laitière

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Les alternatives à la paille de litière

La dolomie :

- Une roche sédimentaire utilisée en amendement,
- **20 à 25 € HT et hors transport,**
- **10 kg de dolomie = 1 kg de paille**



FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
GDS France
FBL France Brebis Laitière

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Décaler les luttes d'automne?

Les précautions à prendre :

- De la disponibilité en **main d'œuvre** pour l'agnelage,
- De la **place en bergerie** pour les brebis puis les agneaux sevrés si besoin,
- Des **quantités d'herbe** disponibles suffisantes en fin de printemps et en été pour assurer les lactations,
- De la nécessité ou non d'avancer les périodes de lutte l'année suivante.





FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
FBL France Brebis Laitière

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Rénover les prairies

Niveau 1



Niveau 2



Niveau 3



LES CRITÈRES À OBSERVER AVANT TOUTE INTERVENTION SUR LA PRAIRIE

NIVEAU ↓	QUALITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PRAIRIE ↓	CONDUITE PRÉCONISÉE ↓
NIVEAU 1	Fond prairial de bonne qualité. Forte densité des espèces sélectionnées pour leur bonne valeur fourragère. Peu de trous et de sol nu.	Amélioration par les pratiques
NIVEAU 2	Fond prairial de qualité moyenne. Les espèces sélectionnées sont toujours présentes. Les trous et le sol nu plus nombreux sont colonisés par des espèces indésirables*.	Sursemis recommandé
NIVEAU 3	Fond prairial de mauvaise qualité. Les espèces sélectionnées ont disparu au profit des espèces indésirables*. Beaucoup de trous et de sol nu.	Semis d'une nouvelle prairie

* Dans ces espèces indésirables, on retrouve à la fois des graminées à faible valeur fourragère, ou très envahissantes, et/ou des dicotylédones à fort pouvoir de colonisation.

FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE · interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE · Confédération Nationale de l'Elevage CNE · LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE · INSTITUT DE L'ELEVAGE idele · RACES DE FRANCE · CHAMBRES D'AGRICULTURE · Jeunes Agriculteurs · GDS France · FBL France Brebis Laitière

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Des espèces indésirables et parfois toxiques



Vegetox.fr

INTER-AGIT+
INTERACTIONS ENTRE AGRICULTURES POUR GÉRER LES INTERCULTURES À L'ÉCHELLE TERRITORIALE POUR DES ACTIVITÉS AGRICOLES PLUS DURABLES

PLANTES TOXIQUES : TOUR D'HORIZON DANS LES PRAIRIES ET LES COUVERTS

Les cas de pathologie chez les ruminants liés à l'ingestion de plantes toxiques sont heureusement rares. Ils peuvent cependant être favorisés par la consommation de couverts non issus de la surface fourragère « traditionnelle » de la ferme telles que les inter-cultures et par des conditions climatiques particulières. Ainsi, les sécheresses qui dégradent les prairies laissent de la place au développement de certaines adventices (morelles noires, datura…) habituellement non présentes dans un couvert dense telle que la prairie.

La piste « intoxication par les plantes » est souvent explorée dans le cas de pathologie dont on a du mal à trouver l'origine. Mais beaucoup d'a priori et méconnaissances existent sur le sujet. Dans le cadre du projet Inter-AGIT+ qui traite du pâturage ovin et bovin des inter-cultures, nous avons souhaité aborder la problématique du risque d'intoxication qui peut exister plus fréquemment que dans les prairies car lié à la présence d'espèces semées qui n'ont pas toujours pour vocation première de nourrir les animaux. Cette fiche présente l'état actuel des connaissances en août 2022.

Rappelons qu'en cas de problème ou ingestion avérée, il est conseillé de contacter son vétérinaire.

Espèces semées à risque, parfois implantées dans un objectif uniquement d'engrais vert ou piège à nitrate mais pouvant être pâturées par les ovins et bovins occasionnellement :

LÉGENDE : Très toxique | Moyennement toxique | Peu toxique | Pas toxique | Pas d'informations

* Les seuils de toxicité indiqués dans le tableau ont été calculés pour des poids moyens de 650 kg pour les bovins et 80 kg pour les ovins.

ESPÈCES	PARTIES TOXIQUES DE LA PLANTE				RISQUE D'INTOXICATION	DOSE CONSOMMÉE*	CONSOMMATION SUR PIED	CONSOMMATION COUPÉE	SYMPTÔMES
NOM FRANÇAIS	Tiges / feuilles	Fruits	Racines	Graines / fruits					
Gesse cultivée et jaune					Rare	Dose inconnue Toxicité = après une consommation en grande quantité	Toxique si consommation de graines	Toxicité persistante dans le fourrage	Troubles neurologiques (faiblesse et paralysie des membres)
Moutarde blanche ou noire					Rare	**Bovin** : mort possible à partir de 780 g de graines **Ovin** : toxique en grande quantité	Toxique si consommation de graines ou de plantes entières à volonté	Toxicité persistante dans le fourrage	Troubles digestifs, respiratoires et baisse de la production laitière, qui apparaissent après 5-10 jours de consommation
Moutarde d'Abyssinie et brune					Rare	Dose inconnue Toxicité = après une consommation en grande quantité	Toxique si consommation de graines ou de plantes entières à volonté	Toxicité persistante dans le fourrage	Problèmes de reproduction. Troubles digestifs, respiratoires, nerveux…
Sarrasin					Rare	Dose inconnue (sans effet visible si faible densité dans le couvert)	Consommation de la plante fraîche rare	Toxicité persistante dans le fourrage	Les symptômes arrivent plusieurs jours après ingestion Photosensibilité[1]
Sorghos type PIPER multicoupes, hybrides S. grains x S. grass					Rare. La plante est toxique sur pied lorsque sa hauteur est < 50-60 cm	Dose létale autour de 2 mg/kg de poids vif Variable selon vitesse ingestion L'ingestion régulière diminue les risques Dose létale en **Bovin** : 1 kg de plante fraîche **Ovins** moins sensibles	Les plantes jeunes, stressées (sécheresse) et les repousses sont les plus toxiques Limiter la vitesse d'ingestion pour limiter les risques	Absence de toxicité une fois sec	Troubles digestifs, neurologiques (tremblements, convulsions), respiratoires et cardio-vasculaires Prévention : apport de complément minéral soufré
Sorghos fourragers monocoupes, grains, multicoupes hybrides Sudan x S. grass					Rare. La plante est toxique sur pied lorsque sa hauteur est < 60-70 cm				
Vesce velue					Très rare	Dose inconnue	Toxique lors de pâturages tardifs si présence de graines	Toxicité persistante dans le fourrage	Troubles digestifs (diarrhée, constipation) et nerveux

1 Hypersensibilité de la peau aux rayons du soleil



FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE | interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE | Confédération Nationale de l'Elevage CNE | LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE | INSTITUT DE L'ELEVAGE idele | RACES DE FRANCE | CHAMBRES D'AGRICULTURE | Jeunes Agriculteurs | GDS France | FBL France Brebis Laitière

INN'OVIN
LA FILIÈRE OVINE RECRUTE

Votre avis pour s'adapter sur le long terme aux sécheresses prolongées?



FNO FÉDÉRATION NATIONALE OVINE
interbev OVINS INTERPROFESSION BÉTAIL & VIANDE
Confédération Nationale de l'Elevage CNE
LA COOPÉRATION AGRICOLE FILIÈRE OVINE
INSTITUT DE L'ELEVAGE idele
RACES DE FRANCE
CHAMBRES D'AGRICULTURE
Jeunes Agriculteurs
GDS France
FBL France Brebis Laitière