• La lettre technique des éleveurs ovins •

N° 67 / MARS 2026

CIIRPO

Entre bergerie et herbe

La pousse de l'herbe a bel et bien démarré, avec près de deux semaines d'avance par rapport à l'an dernier. Dans de nombreux élevages, plusieurs lots de brebis sont toutefois en bergerie, notamment en raison des agnelages en cours.

Du nouveau sur les consommations en eau

Les références d'ingestion en eau ont été actualisées en 2023 et 2024, entre autres au CIIRPO, sur le site du Mourier (87), pour les brebis en fin de gestation et en lactation. Les mesures réalisées au cours des neuf semaines de lactation indiquent une consommation moyenne journalière d'eau de 8,5 litres.

Celle-ci varie en fonction de deux critères :

- Le type génétique : avec la même ration, une brebis F1 (Ile de France croisée Romanov) consomme en moyenne 9,5 litres d'eau par jour contre 7,1 litres pour une femelle Mouton Vendéen (graphe). Ramenés au kg de matière sèche ingéré (foin et concentrés), les niveaux d'ingestion sont respectivement de 3,4 et 2,9 litres pour ces deux types génétiques.
- Le stade de lactation : les consommations en eau s'établissent à 11 litres au cours des 2 premières semaines chez une brebis F1 contre 9,2 litres les 7 suivantes. La tendance est la même chez une femelle Mouton Vendéen.


POUR PLUS D'INFOS > CLIQUEZ ICI
Pour accéder à la fiche technique "Les consommations en eau des brebis en bergerie" disponible en ligne

C'est bon à savoir

Une brebis en début de lactation boit 10 litres d'eau par jour avec une ration sèche en bergerie.

Un peu plus de 8 litres d'eau sont ingérées en moyenne au quotidien par une brebis en lactation.

CONSOMMATIONS D'EAU DES BREBIS EN LACTATION



Source : CIIRPO/IDELE 2025

5 litres par jour pour un agneau de bergerie

Les mesures de consommations d'eau de plusieurs lots d'agneaux du sevrage à la vente montrent une variabilité importante. Ramenés au kg de matière sèche ingéré, les niveaux d'ingestion varient en effet du simple au triple sans qu'un facteur explicatif ait pu être identifié (la température dans la bergerie par exemple). En moyenne, avec un aliment concentré et un fourrage (foin ou paille) distribués à volonté, un agneau boit quotidiennement 3,8 litres d'eau par kg de matière sèche ingéré. Entre 70 et 120 jours, ce type d'animaux consomme environ 1,4 kg de matière sèche par jour (1,2 kg de concentré + 0,2 kg de fourrage).



Les mesures de consommation d'eau ont été enregistrées avec : une ration sèche, des abreuvoirs à pipette à raison d'un pour 6 brebis, une plage de températures de -4 à 34 °C dans la bergerie.

À propos...

C'est un éleveur qui le dit

« D'habitude, je passe la herse étrille sur toutes les prairies de mes brebis et vaches. Cela écarte les taupinières et les bouses des vaches et décolle les mousses. Compte tenu du prix du carburant, je ferai l'impasse ce printemps ».

Chiffres clefs

Consommations en carburant des élevages ovins viande en France* :

- 40 litres/ha pour les élevages avec un niveau de chargement annuel de 8 brebis/ha,
- 30 litres/ha pour les élevages avec un niveau de chargement annuel de 5 brebis/ha.

* Source : Inosys Réseaux d'élevage 2024

Le pâturage des prairies nouvellement implantées

Le pâturage des prairies par des brebis au cours de l'hiver suivant leur semis favorise le développement des légumineuses. En effet, selon des essais en cours[1], leur proportion est multipliée par deux (33 % contre 17 %). Cela s'explique par le fait que le pâturage permet aux trèfles d'accéder plus facilement à la lumière. De plus, le rendement de la première coupe de printemps, réalisé en ensilage ou en enrubannage, n'est pas modifié. Enfin, les mesures de densité du sol indiquent une absence de compaction liée au pâturage des brebis.

[1]Projet ACCOMPLiR piloté par Idele et financé par le CASDAR

WEBINAIRE > INSCRIPTION ICI
Organisé sur le sujet le 29 mai 2026 de 11 h à midi.



Les tiques : de petits parasites vecteurs de maladies

La population de tiques est en nette augmentation depuis quelques décennies. Ce parasite a besoin d'humidité et se rencontre essentiellement dans les forêts et les haies. La tique attend sur un brin d'herbe ou sur une branche basse qu'un hôte (brebis, agneau...) passe à proximité puis elle s'y accroche. Elle cherche alors une zone où la peau est fine et bien vascularisée et s'y fixe. Une fois bien gorgée (en général après 48 h), la tique se détache et se laisse tomber au sol pour muer ou pour pondre. Mais entre-temps, elle est susceptible de transmettre de nombreuses maladies : piroplasmose, l'ehrlichiose, l'anaplasmose, fièvre Q ou maladie de Lyme. Pour limiter l'impact des maladies transmises par les tiques, il est conseillé d'exposer les jeunes animaux aux tiques afin qu'ils développent une immunité sans signe clinique. Enfin, la tique choisissant ses proies, une bonne vermifugation et une complémentation minérale solide limitent également les infestations.

Agenda

- Le 27 mai : Journée de l'Élevage de la Vienne. **Demande de renseignements ici**
- Le 7 avril de 11 h à midi : Webinaire CIIRPO sur le thème de l'allaitement artificiel. **Inscription ici**
- Le 9 juillet : rencontres des techniciens et des enseignants du CIIRPO. **Inscription ici**

POUR EN SAVOIR PLUS :

Des fiches techniques, des podcasts et des vidéos sont disponibles en ligne sur idele.fr et inn-ovin.fr

Prochaine lettre en mai 2026

Document réalisé par les techniciens des structures adhérant au CIIRPO des régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire.

Membres du comité de rédaction de cette lettre : Nathalie Augas (Chambre d'agriculture de la Charente), Alice Claessens (Chambre d'agriculture de la Vienne), Nathalie Lebraud (Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne), Camille Joly (Chambre d'agriculture du Lot) et Laurence Sagot (Idele/CIIRPO).

Avec la participation de Delphine Daniel, vétérinaire à l'Alliance Pastorale.

Coordonné et rédigé par Laurence Sagot (CIIRPO/Idele).

Avec le soutien financier de :

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

Cofinancé par l'Union européenne

Pub 0026311026 - ISSN 2268-1094 - © Photos: CIIRPO