




LES PRINCIPALES PRÉSENTATIONS DE L'AGNEAU À L'AGNELAGE

LES DEUX PRÉSENTATIONS NORMALES DE L'AGNEAU

À gauche, la plus fréquente par les pattes avant,
À droite, par les pattes arrière (l'agneau peut être sur le ventre ou sur le dos).



LA RÈGLE DES 3 X 30 POUR SAVOIR QUAND INTERVENIR

- Depuis 30 mn : la poche des eaux est visible,
- Depuis 30 mn : l'agneau semble en position normale mais la mise bas n'avance pas,
- Depuis 30 mn : le premier agneau est né et le jumeau n'apparaît pas.

D'autres infos sont disponibles en ligne




Rédaction : Laurence Sagot (Idele/CIIIRPO) et Pierre Autef (vétérinaire).

Avec le soutien financier de :




N° PUB. 00301100 - ISBN 978-2-7143-8027-1 © Photos: CIIIRPO - Janvier 2024

SEPT POSITIONS QUI DEMANDENT SOUVENT UNE INTERVENTION




La tête et l'une des pattes avant sont extériorisées

- S'il est possible de rentrer la tête, sortez une patte puis l'autre en longeant les épaules,
- S'il n'est pas possible de rentrer la tête, gardez la position « en crawl ». Tirez sur la patte avant de l'agneau. Avec l'autre main, positionnez l'autre épaule en appuyant sur l'articulation.




La tête est extériorisée, les pattes avant sont pliées

- S'il est possible de rentrer la tête, sortez une patte puis l'autre en longeant les épaules,
- S'il n'est pas possible de rentrer la tête, attrapez une patte en longeant une épaule. Sortez l'agneau en position « crawl ».




La tête est retournée, les pattes avant sont bien positionnées

Repoussez l'agneau et ramenez la tête dans la bonne position en la penchant sur un côté. Puis, tirez sur les pattes en s'assurant que la tête est bien engagée.




La tête se présente par la nuque, les pattes avant sont bien positionnées

Repoussez l'agneau. Ramenez la tête dans la bonne position en passant les doigts sous le menton. Puis tirez sur les pattes en s'assurant que la tête est bien engagée.



L'agneau est en siège

Repousser l'agneau. Dépliez complètement les pattes arrière avant de sortir l'agneau (en deux étapes en passant par la position accroupie). Attention à bien positionner la queue dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si elle est retournée vers l'avant, une déchirure utérine est possible.



Torsion utérine

Il n'y a pas eu de poche d'eau visible. À l'examen, on a une sensation de sac qui serait fermé et tordu. Seule une césarienne permet de sauver l'agneau dans la grande majorité des cas.


Les agneaux sont emmêlés

- Pour comprendre la situation, repoussez les membres extériorisés,
- Commencez par identifier une tête. Puis longez les épaules pour identifier une et les deux pattes. Sortez-les. L'agneau peut également être mis au monde en position « crawl ». Si une queue ou une patte arrière est identifiée, longez la cuisse pour identifier la seconde puis les dépliez complètement avant de sortir l'agneau.



CINQ ASTUCES POUR FACILITER LA MISE BAS

1. **Lubrifier** lors d'une mise bas difficile.
2. **Si le col n'est pas dilaté**, le masser doucement avec les doigts. Les injections d'ocytocine et de calcium facilitent l'intervention à condition de pouvoir passer deux doigts.
3. **Pour reconnaître les pattes avant des pattes arrière**, suivre la patte et ses articulations : une patte avant forme un U ; une patte arrière un Z.
4. **Pour une meilleure préhension des pattes**, utiliser de la « ficelle bleue » nouée juste au-dessus du sabot.
5. **Pour faciliter la naissance**, mettre deux doigts dans l'anus de la brebis pour passer derrière le haut de la tête de l'agneau puis l'accompagner pour la sortir.



↑ Différenciation des pattes



↑ Utilisation de la ficelle bleue