

Floraison de nos campagnes : des repères de gestion de l'herbe ?

Equipe Fourrages Chambre d'agriculture du
Puy de Dôme


fourrages@puy-de-dome.chambagri.fr

Biennales des Conseillers fourragers - 21 au 23 octobre 2025
Lycée agricole Naturapolis - Châteauroux



Les prairies au coeur des systèmes d'élevage

Part des prairies dans la SAU (2020)
Département du Puy de Dôme



PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Service régional d'information statistique économique et territoriale
Pôle études, valorisation et administration des données
09 janvier 2025
Source : Agreste - Recensement agricole 2020
Méthode : Lissage à l'exploitation sur un rayon de 10 km, grille de 1 km
Référentiels, fond carto. : IGN Admin Express 2024, BD ALTI

en pourcentage

- > 75
- 50 à 75
- 25 à 50
- ≤ 25

• Contexte

Un gradient d'altitude allant de 300 à 1800 m d'altitude

Un département avec une très forte proportion de prairies où les élevages bovins et ovins dominent

La prairie est la base de l'alimentation des troupeaux (pâturage et fauche)



Les prairies riches d'enseignement

Eleveurs

- **Enjeux**
Bien gérer l'herbe, en adaptant ses pratiques, permet d'assurer des enjeux économiques, techniques et environnementaux

Conseillers



- **Interrogations**
En s'appuyant sur les méthodes et outils existants, repérer la **floraison d'espèces végétales facilement reconnaissables** pourrait fournir des indicateurs supplémentaires en termes de gestion de l'herbe ?
- **Objectif : fournir un repère visuel simple** pour anticiper et ajuster les pratiques

Une méthode volontairement très simplifiée

- Données collectées



1564
enregistrements
pour 282 espèces

Sommes de
températures
(base 0 – 18°C
depuis le 01/02)

Déterminer des
classes de fiabilité

Retenir 28 espèces !

Repères : Mise à l'herbe,
fin du déprimage,
ensilage, foin,....

une espèce
=
un repère de
gestion de
l'herbe



JONQUILLE



**CARDAMINE
DES PRÉS**



**PISSENLIT
en graine**

Qui fleurit à quel moment ?



ANIMATION POUR LES ÉLEVEURS

LA VÉGÉTATION
DÉMARRE

200 °



JONQUILLE

MISE À L'HERBE
PRÉCOCE

250 °



PISSENLIT
début de floraison

MISE À L'HERBE
MOYENNE

300 °

?

FIN DU
DÉPRIMAGE

500 °



**SILÈNE
ENFLÉE**

DÉBUT DE
L'ENSILAGE

700 °

FOIN
PRÉCOCE

900 °

S'approprier les repères de gestion de gestion d'une autre façon



- Reconnaître les espèces



- Positionner les espèces sur une frise chronologique dans l'ordre d'apparition de leur floraison



- Associer les repères de gestion de l'herbe

A vous de jouer !

