


Adapter les systèmes fourragers face au changement climatique

Piloter les ressources alimentaires dans un contexte de changement climatique

Implantation de prairies sous couvert de CERPRO




3 natures de mélanges de couvert


	Triticale	Avoine	Pois four.	Pois Protéa.	Vesce	Féverole
Protéagineux	-	40	15	40	15	20
Mixte	125	-	15	-	15	20
Céréales	250	-	15	-	-	15

+ PFV: 10 kg fétuque élevée - 8 kg de RGA - 3 kg de TB - 3 kg de TH - 3 kg de Lotier

3 stades de récolte en fourrage




Journée portes ouvertes - Ferm'inov - 27 mai 2025




Adapter les systèmes fourragers face au changement climatique

Piloter les ressources alimentaires dans un contexte de changement climatique

Productivité des mélanges



Valeurs nutritives des mélanges



Approche économique

Stade	Précoce (09 mai)		Intermédiaire (22 mai)		Tardif (08 juin)		
Nature	Protéa +	Mixte	Protéa +	Mixte	Protéa +	Mixte	Céréales
€/ha	762	698	792	728	782	718	692
€/tMS	91	77	80	73	76	63	63
€/tMAT	612	570	587	644	660	597	710
€/1000 UFL	96	84	87	81	87	73	75

Journée portes ouvertes - Ferm'innov - 27 mai 2025