



**FICHE
AUTOSYSEL**

Pâturage mixte simultané

« Des vaches allaitantes et des brebis pour optimiser le pâturage »

Gaec Marcilly à Provençy (89)



POURQUOI CE CHOIX DE SYSTEME ?

« L'association vaches et brebis était traditionnelle dans l'Avallonnais il y a 30 ans, mais peu à peu avec l'agrandissement et le retournement des prairies, nos voisins ont choisi la mixité bovin viande - grandes cultures.

Depuis notre installation en 1995, le système a peu évolué, la même surface, un peu plus de vaches, beaucoup plus de brebis et moins de chevaux. Nous avons augmenté la troupe ovine jusqu'à 280 femelles, par goût et pour ne pas investir à nouveau en bâtiments.

*Nous avons développé la production ovine d'abord pour les aides car, installés sans la transparence, nous n'avions pas droit à davantage de primes à la vache allaitante. Rapidement, nous nous sommes rendus compte des multiples avantages du **pâturage mixte bovin ovin** :*

- *amélioration de la qualité des prairies, pas de renoncule ni de pissenlit dans les parcelles pâturées par les brebis, des prairies gazonnantes à hauteur homogène où lotier, vesce, trèfle se développent.*
- *économie en foin et en concentré grâce au pâturage hivernal des brebis ».*

LES POINTS DE VIGILANCE

● Choisir une race de brebis herbagère

Le Gaec de Marcilly a opté pour le Texel pour son aptitude au plein air intégral, sa conformation et son calme. Les brebis entrent en bergerie uniquement pour agnelier et sont mises à l'herbe dès que les agneaux ont 3 semaines.

● Consacrer beaucoup de temps pour la surveillance

Tous les troupeaux sont visités une fois par jour. En plus de la surveillance classique, il faut être particulièrement vigilant en automne hiver pour détecter les brebis qui perdent de l'état corporel.

● Un parcellaire groupé facilite la surveillance

Le Gaec de Marcilly exploite un parcellaire de 150 ha d'un seul tenant, un chemin à traverser et un deuxième bloc de 30 ha.

● Un quad est indispensable

De grandes parcelles de 10 à 25 ha, des bovins et des ovins qui, bien que dans la même parcelle, se mélangent rarement nécessitent beaucoup de déplacements, plus faciles en quad.

EN PRATIQUE

● De l'extensif en pâturage continu

Pour les associés du Gaec de Marcilly, le bien-être de leurs animaux est prioritaire, ils doivent pâturer dans de grandes parcelles, trouver des abris naturels, une grande variété d'espèces prairiales et de l'herbe courte.

La règle est donc le pâturage continu. La surface mise à disposition est de 50 ares par UGB au printemps sur les parcelles qui seront agrandies après fauche et de 60 ares par UGB sur les parcelles uniquement pâturées. Les lots constitués au printemps évoluent peu au cours de la saison de pâturage. L'objectif est de constituer des lots de 25 bovins auxquels s'ajoutent parfois des brebis pour obtenir le chargement souhaité.

Dans les plus grandes parcelles, au début du printemps, toute la surface est pâturée. Ensuite, à partir de début mai, une partie est mise en défens à la clôture électrique pour être fauchée. Cette pratique permet de moduler les surfaces en fauche et en pâture en fonction de la pousse de l'herbe.

Les 2/3 de la surface sont fertilisés avec 25 unités d'azote. La décision de fertiliser n'est pas fonction du mode d'exploitation mais de la pousse de l'herbe et de la connaissance du potentiel des parcelles.

4 parcelles pour une surface totale de 55 ha sont clôturées en ursus. Les brebis pâturent essentiellement en compagnie des vaches allaitantes.

Les points d'amélioration envisagés

Finir les agneaux : Rapportée à la brebis, la consommation totale de concentré est de seulement 27 kg car actuellement les agneaux sont commercialisés en maigre, par facilité, mais aussi pour des aspects pratiques (l'exploitation ne dispose pas de suffisamment de parcelles clôturées en ursus pour constituer l'été un lot supplémentaire d'agneaux complémentés). Un essai de clôture d'une partie de parcelle en électrique sera réalisé en 2017.

Regrouper les agnelages : Le bâtiment d'agnelage (ancienne écurie) a une capacité de 80 brebis, aussi quatre lots (dont un d'antennaises) sont constitués pour répartir les mises bas de janvier à avril. Pour faciliter le travail et améliorer les résultats d'agnelage (la race Texel très saisonnée exprime tout son potentiel en agnelage de mars avril), il est envisagé de faire agneler à partir du mois de mars en utilisant un bâtiment de stockage vide en fin d'hiver.

SI C'ÉTAIT A REFAIRE

Clôturer les 2/3 de la surface en ursus.
Équiper un bâtiment en bergerie ou construire une bergerie type abri léger.

UN CONSEIL A UN ELEVEUR

Choisir une race ovine adaptée à ce système.
S'équiper un minimum pour manipuler la troupe ovine et ainsi faciliter la surveillance.
Clôturer en ursus pour le plus de parcelles possibles.

IMPACTS

Autonomie

La mixité bovin-ovine avec une proportion suffisante de brebis (plus de 2 brebis par vache) renforce l'autonomie alimentaire car les brebis consomment peu de foin ce qui permet de donner plus de fourrages aux vaches et donc d'économiser du concentré.

Economie

Par UGB, ce système permet de récolter moins de fourrage. Il est donc plus économe qu'un système bovin spécialisé.

Travail

« C'est un travail très en contact avec les animaux. Le temps consacré à la surveillance est très important ».

Environnement

Un paysage entretenu et diversifié. Une exploitation économe en énergie, 46 l de gasoil par ha et une consommation totale d'énergie de 5220 MJ/ha.

Un système de production qui répond aux attentes des consommateurs.

L'EXPLOITATION EN BREF

Exploitation Bovin viande - Ovin viande

Main-d'œuvre 2 UMO

SAU 177 ha dont 153 ha de prairies naturelles, 7 ha de luzerne, 17 ha de cultures (7 ha autoconsommées).

Troupeaux

105 vaches allaitantes en système broutard	210 brebis, 70 agnelles Texel
Vente de reproducteurs	Vente d'agneaux maigres
Productivité 87%	Productivité 117%
Concentré 385 kg / UGB	Concentré 27 kg / brebis

Chargement 1,24 UGB/ha SFP

