




Premier prix régional Guillaume RENAULT (37)

Concours Parie sur ta Prairie Centre-Val de Loire - 2025




L'exploitation



Activité : Bovin lait – 64 VL et 15 génisses et atelier d'engraissement de veaux croisés
Race : croisement Frisonne/Rouge Scandinave/Jersiaise
Chargement moyen : 1,1 UGB /ha SFP
Périodes de mises-bas : 2 périodes (du 15 janvier au 1^{er} mars et du 15 août au 1^{er} octobre)
Performances animales : 6 500 L/VL
Durée d'hivernage : 3 mois

Assolement (SAU de 90 ha)



Pluviométrie 2025 : 550 mm
Pluviométrie moyenne : 700 mm

La prairie lauréate

Contexte pédoclimatique

Sol : limons battants et perruches, argiles hydromorphes en-dessous de 30 cm
Surface : 5,1 ha
Précocité de départ en végétation : 20 février/5mars
Localisation : 1 km de la ferme

Objectifs de l'éleveur

Parcelle du circuit de pâturage qui peut être débrayée pour faire de l'ensilage s'il y a suffisamment d'herbe sur les autres parcelles

Choix d'une composition adaptée


Semis en septembre 2020 (6 ans)

Mélange semé (mélange maison, 23 kg/ha) :

- 8 kg de fétuque élevée
- 5 kg de dactyle
- 2 kg de raygrass anglais
- 2 kg de raygrass hybride
- 3 kg de trèfle blanc (2 variétés)
- 3kg de trèfle violet

→ Mélange réfléchi pour avoir une pousse de l'herbe régulière et appétente sur les 3 saisons

Rotation culturale



■ Prairie temporaire

Conduite de la prairie

10 cycles de pâturage : 6,5 tMS/ha

- Parcelle découpée en **12 paddocks de 44 ares**
- **1 paddock jour et 1 paddock nuit** → 12h/paddock
- Temps de retour de **28 jours**
- **Hauteur de sortie adaptée à la saison** (4-5 cm en février/mars et 6-7 cm d'avril à novembre)
- **Silos fermés** et ration 100% pâturage du 01/04 au 15/06 et du 15/09 au 15/10
- **Mesures d'herbe hebdomadaires** de février à novembre

Fertilisation

- **Fumier évolué**



Etat de la prairie en 2025 et pistes d'amélioration

Points positifs

- Prairie très homogène avec un bon équilibre entre graminées et légumineuses
- Travail sur le choix des espèces
- Très bonne gestion du pâturage pour avoir su maintenir l'équilibre entre espèces
- Bon dimensionnement des paddocks pour stimuler l'ingestion
- Vêlages groupés en cohérence avec la pousse de l'herbe
- Création de chemins
- Accès à l'eau dans tous les paddocks
- Agroforesterie pour abriter les animaux du vent et du soleil
- Choix du croisement 3 voies pour avoir des animaux plus légers et ainsi moins compacter les sols au pâturage



Idées pour s'améliorer

- Doper la fertilisation au printemps pour booster la production sur le printemps et éventuellement faire une première coupe conséquente en ensilage






Premier prix territorial Ferme des Bourdeaux (37)



Concours Parie sur ta Prairie Centre-Val de Loire - 2025

L'exploitation



Activité : Bovin lait – 85 VL et 50 génisses
Race : Holstein et Montbéliardes
Chargement moyen : 1,2 UGB /ha SFP
Périodes de mises-bas : toute l'année
Performances animales : 9 000 L/VL
Durée d'hivernage : 3 mois

Assolement (SAU de 160 ha)



- Prairies temporaires
- Prairies permanentes
- Méteil (avoine/vesce)
- Prairies d'association (RGH/TV)
- Maïs ensilage
- Céréales autoconsommées



Pluviométrie 2025 : 800 mm
Pluviométrie moyenne : 750 mm

La prairie lauréate

Contexte pédoclimatique

Sol : limons battants et perruches
Surface : 9 ha
Précocité de départ en végétation : mi-février
Localisation : 1 km de la ferme

Objectifs de l'éleveur

Fauche en première et deuxième exploitation puis
pâturage des génisses

Choix d'une composition adaptée


Semis en septembre 2017 (8 ans)

Mélange semé (39,3 kg/ha) :

- 20 kg de dactyle (*Lucullus*)
- 10 kg de fétuque élevée (*Philona*)
- 5 kg de raygrass anglais (*Aberchoice*)
- 2,5 kg de trèfle blanc (*Alice+Huia*)
- 1,8 kg de lotier (*Lotar*)

→ Mélange résistant au sec et trèfles annuels pour
faire de la biomasse en 1^{ère} exploitation

Rotation culturale



Prairie temporaire ■ Blé ■ Maïs

Conduite de la prairie

Fertilisation


- 20 uN en février
- 30 uN après chaque coupe
- 20 m³ de lisier en décembre

Deux coupes en ensilage : 6 tMS/ha

- Choix d'espèces et de variétés plutôt tardives pour maximiser la production sur le printemps et bien valoriser les apports d'azote
- Fauche à 8-10 cm de hauteur pour ne pas pénaliser les repousses

Pâturage des génisses : 1,5 tMS/ha

- Parcelle découpée en 3 paddocks de 3 ha
- Pâturage par 20 génisses et 1 taureau
- 1 mois de temps de présence
- Pâturage libre quand il n'y a plus d'herbe



Etat de la prairie en 2025 et pistes d'amélioration

Points positifs



- Prairie plutôt dense
- Faible salissement
- Prairie encore productive
- Prairie adaptée au système et aux objectifs de l'éleveur

Points négatifs



- Absence de légumineuses liée à une fertilisation élevée au printemps et à un rythme d'exploitation en fauche
- Le temps de présence par paddock est très long, le pâturage tournant permettrait de mieux valoriser l'herbe

Idées pour s'améliorer



- Sursemis de trèfles (hybride et blanc)
- L'éleveur souhaite réduire le niveau de fertilisation de la parcelle pour faire revenir les légumineuses
- L'éleveur travaille sur des implantations de prairies sous couvert de méteil.






Premier prix territorial GAEC Trémeau (45)

Concours Parie sur ta Prairie Centre-Val de Loire - 2025




L'exploitation



Activité : Bovin lait – 70 VL et 50 génisses
Race : Holstein croisées Montbéliardes et Normandes
Chargement moyen : 0,7 UGB /ha SFP
Périodes de mises-bas : toute l'année
Performances animales : 7 000 L/VL
Durée d'hivernage : 2 mois et demi

Assolement (SAU de 203 ha)



Pluviométrie 2025 : 700 mm
Pluviométrie moyenne : 790 mm

La prairie lauréate

Contexte pédoclimatique

Sol : sable, parcelle drainée
Surface : 1,4 ha
Précocité de départ en végétation : mi-février
Localisation : 150 m de la ferme

Objectifs de l'éleveur

100% pâturage à moins que l'herbe ne soit trop avancée en début de saison, faute de portance, auquel cas elle est fauchée


Choix d'une composition adaptée

Semis en septembre 2021 (4 ans)
Mélange semé (mélange maison, 25 kg/ha) :

- 10 kg de raygrass hybride typé italien (Plétor)
- Trèfle blanc (Dublin)
- Trèfle squarrosus (Athea)
- Trèfle incarnat (Cardinal)
- Trèfle hybride (Dawn)
- Trèfle violet (Rozeta)

→ Mélange résistant au sec et trèfles annuels pour faire de la biomasse en 1^{ère} exploitation

Rotation culturale




Conduite de la prairie

Fertilisation

- Fumier et chaulage tous les 5 ans au cours de la rotation

13 cycles de pâturage : 7 tMS/ha

- 70 VL au pâturage
- Temps de présence de 12h en début de saison puis de 24h tout le reste de l'année
- Temps de retour de 21 jours au printemps puis plus long
- Quelques fauches de refus si besoin



Etat de la prairie en 2025 et pistes d'amélioration

Points positifs



- Prairie dense et très homogène
- Très bel équilibre entre graminées et légumineuses, idéal pour nourrir des VL
- Toutes les espèces semées sont encore présentes
- Très bonne gestion du pâturage pour avoir su maintenir l'équilibre entre espèces
- Le salissement est négligeable

Points négatifs



- Le temps de repos entre deux tours de pâturage pourrait être allongé en été pour préserver la prairie

Idées pour s'améliorer



- L'éleveur a prévu de remplacer le RGH par du RGA, plus adapté au pâturage
- La parcelle pourrait être recoupée en deux pour limiter les fauches de refus






Premier prix territorial GAEC Rochereau (36)

Concours Parie sur ta Prairie
Centre-Val de Loire - 2025



L'exploitation



Activité : Bovin viande – 200 vêlages

Race : Limousine


Chargement moyen : 1,3 UGB /ha SFP

Périodes de mises-bas : 70% de vêlages en septembre-octobre et 30% de vêlages de mars à mai

Performances animales : 470 kg carcasse pour les femelles en finition et 420 kg pour les jeunes bovins à 14,5 mois

Durée d'hivernage : 4 à 5 mois

Assolement (SAU de 253 ha)



Pluviométrie 2025 : 700mm

Pluviométrie moyenne : 650 mm

La prairie lauréate

Contexte pédoclimatique

Sol : argilo-limoneux → bas de la parcelle hydromorphe mais haut saint

Surface : 6,67 ha

Précocité de départ en végétation : début mars

Localisation : 1 km de la ferme

Objectifs de l'éleveur

Faire une première coupe volumineuse en ensilage au début du printemps puis faire pâturer les repousses

Choix d'une composition adaptée

Semis en octobre 2017 (8 ans)

Mélange semé (mélange Tout Terrain de chez Cérience, 30 kg/ha) :

- 12,3 kg fétuque élevée (Iliade et Romie)
- 5,4 kg de dactyle (Tardy et Lucullus)
- 1,8 kg de RGA tétraploïde (Elixir)
- 4,2 kg de trèfle violet (Lestris et Diplo)
- 1,8 kg de lotier corniculé (Gran San Gabrielle)
- 4,5 kg de trèfle blanc (Melifer, Giga et Aberace)



Rotation : Prairie 5 à 8 ans – maïs ensilage – RGI 1 an – sorgho fourrager

Conduite de la prairie

Fertilisation


- Deux apports au début du printemps (40 UN/ha mi-février et 40 uN/ha au 20 mars) pour stimuler la croissance

Première coupe en ensilage pour maximiser le volume stocké : 5 tMS/ha

- Choix d'espèces précoces pour maximiser la production sur le début du printemps (RGH, fétuque élevée) et bien valoriser les apports d'azote
- Fauche à 8-10 cm de hauteur pour ne pas pénaliser les repousses qui seront pâturées

Pâturage sur les 3 cycles suivants : 2 tMS/ha

- Parcelle découpée en paddocks de 2 ha
- Pâturage par des vaches suitées et 1 taureau
- Sortie du paddock à 5-7cm de hauteur
- Temps de retour de 45 jours entre les cycles de pâturage



Etat de la prairie en 2025 et pistes d'amélioration

Points positifs



- Prairie encore très dense et propre alors qu'elle a 8 ans
- Bon niveau de production
- Renouvellement des prairies temporaires par des cultures d'été
- Bonne gestion des temps de retour au pâturage et des hauteurs de fauche

Points négatifs



- Evolution de la composition de la prairie depuis le semis : disparition du lotier (trop de concurrence), du trèfle blanc (mélange orienté vers la fauche en première intention), du trèfle violet (manque de pérennité) et des graminées autres que la fétuque élevée

Idées pour s'améliorer



- S'orienter vers des espèces plus précoces pour mieux valoriser l'azote disponible (variété de fétuque élevée avec démarrage en végétation rapide)

