



Le réseau thématique « Finition à l'herbe sous Signes d'Identification de Qualité et d'Origine (SIQO) » mobilise des éleveurs bovins viande sur toute la France pour produire des références technico-économiques.

Le suivi des fermes de ce réseau vise à explorer les conduites de finition basées sur l'herbe (pâturée ou conservée) des bovins produits sous signe officiels de qualité.

IGP Fleur d'Aubrac



Viande bovine de l'Aubrac

Produit : Génisses nées, élevées et abattues sur la zone (Aveyron, Cantal, Haute-Loire, Lozère)

Filière : 156 éleveurs de la coopérative CELIA et 1525 génisses par an

Débouchés : Boucheries, supermarchés, restaurateurs

Spécificités du cahier des charges :

- Femelles croisées (Mère Aubrac x Père Charolais)
- Age : abattues entre 26 et 42 mois
- Poids carcasse minimum de 280 kg
- Exclusivement foin et maïs interdit aux plus de 18 mois
- Pâturage à volonté



Élevage bovins viande en région Occitanie

GAEC de Chantegrenouille sur le plateau de l'Aubrac : Produire de la viande sous signe officiel de qualité en engraisseur à l'herbe

Chiffres clés de l'exploitation

Main-d'œuvre :

2 UMO, Antoine GERBAL et son oncle Vincent GRANIER

SAU :

161 ha tout en herbe dont 9 ha de prairies temporaires

Troupeau :

83 vaches Aubrac, Atelier de poulets en Bio

Production de viande :

Broutards mâles Aubrac et Croisés repoussés à 400 kg, quelques femelles croisées en broutardes, Génisses et vaches finies

Commercialisation :


Coopérative CELIA

Chargement apparent :

0,7 UGB /ha SFP

Figure 1

Assolement



Bilan des ventes sous SIQO

	NOMBRE	ÂGE	POIDS CARCASSE	ETAT ENGRAISSEMENT	CONFORMATION
Vaches	20	7 ans	379 kg	3	R =
Génisses	6	34 mois	448 kg	3	U+

Les femelles croisées sont en partie vendues en broutardes et le reste en IGP Génisses Fleur d'Aubrac.

Les vaches engraisées sont vendues sous Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac.



FINITION À L'HERBE

Bœuf fermier Aubrac :

Les vaches destinées à être réformées en Label commencent à être pré-engraissées au mois d'avril avec la même ration de base que les vaches et une complémentation entre 1 et 2 kg par jour. Au mois de mai, elles ne ressortent pas et sont mises au tunnel où elles passeront progressivement à une ration finition avec foin à volonté et 5 kg d'un aliment complet.

Génisses Fleurs d'Aubrac:

Elles sont conduites à l'intérieur dans un tunnel par case de 4 ou 5 avec de l'enrubannage de ray grass comme fourrage. La phase de finition démarre en mars avec 1 kg d'aliment complet par jour et augmente progressivement jusqu'à 5-6 kg en juillet-août.

RATION DE FINITION

	KG BRUT	KG MS
Enrubannage Ray Grass	8 kg	4,5 kg
Aliment complet	6,5 kg	5,9 kg
Total / jour	14,5 kg	10,3 kg

La ration d'engraissement des génisses couvre un GMQ de 1250 gr minimum (total apport 9 UFV, 1100 PDI)

La durée de finition moyenne est de 3 mois (de 1 à 4 mois selon l'état de l'animal au début).

GESTION DE L'HERBE

Les prairies temporaires se composent essentiellement de Ray grass hybride enrubanné de bonne heure fin mai de façon à avoir du regain à faire pâturer. Les prairies naturelles multi espèces sont principalement pâturées.

Mode d'utilisation des prairies :

- 25 ha en foin
- 25 ha en enrubannage
- 111 ha de pâture

LEVIERS D'AMELIORATION

- Réaliser un pâturage tournant pour les génisses croisées comme ce qui est fait pour les couples mères-veaux actuellement.
- Au printemps, arriver à sortir les lots de femelles d'un an pour avoir de bonnes croissances à l'herbe.
- Réintégrer du trèfle violet dans les prairies temporaires pour gagner en protéines et peut être arriver à diminuer un peu les concentrés.
- Arriver à récolter des fourrages de bonne heure pour optimiser la qualité.

Témoignage

Antoine GERBAL,
Éleveur à Saint-Laurent
de Muret (48)

Pourquoi produire sous SIQO ?

Le choix d'un mode de production sous SIQO correspond à une recherche de meilleure valorisation des carcasses.

Pourquoi la démarche Fleurs d'Aubrac ?

J'ai fait le choix d'intégrer une filière locale qui valorise une race adaptée au territoire, en zone difficile.

L'IGP Fleur d'Aubrac permet une optimisation de la complémentarité des races (Aubrac X Charolais). Je suis convaincu de la plus-value apportée par le croisement qui permet de bénéficier à la fois des qualités bouchères et des aptitudes laitières.

Quels conseils pour bien gérer l'herbe ?

Nous cherchons à produire un maximum de fourrages, d'où la recherche d'estives pour les couples de façon à garder les parcelles autour de l'exploitation pour la fauche et gagner en autonomie fourragère. De plus, en récoltant les prairies temporaires ray grass - trèfle le plus tôt possible en stade vraiment début épiaison nous espérons gagner en autonomie protéique.

Comment optimiser la finition à l'herbe ?

Pour optimiser la finition à l'herbe, il faudrait sortir les lots d'animaux plus tôt que ce que l'on pratique en gagnant sur le pâturage tournant, les compléter à l'auge dehors de façon à profiter au maximum de la pousse de l'herbe.

Fiche réalisée par :

Emeric PELISSIER – Chambre d'agriculture de Lozère
(06 07 16 02 35)

Document édité par l'Institut de l'Élevage

149, Rue de Bercy - 75595 Paris Cedex 12 - www.idele.fr
Septembre 2023 - Réf. Idele : 0023 311 006

Conception : Beta Pictoris - Réalisation : Mélanie Colombel
(Institut de l'Élevage) - Crédits photos : Gilles GAPIHAN, Emeric PELISSIER

Pour en savoir plus : www.inosys-reseaux-elevage.fr



Un dispositif partenarial associant des éleveurs, et des ingénieurs de l'Institut de l'Élevage et des Chambres d'agriculture pour produire des références sur les systèmes d'élevages. Ce document a été élaboré avec le soutien financier du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (CasDAR) et de la CNE.

