



Le réseau thématique RT18 «Systèmes Ovins Bio», dit RESOV'Bio, mobilise 9 éleveurs ovins viande bio et 1 éleveur ovins lait bio répartis sur toute la France, pour établir des références technico-économiques en conduite ovine bio.

Les éleveurs du réseau élargi ont répondu à notre enquête sur la Gestion Sanitaire dans leur élevage



Élevages ovins lait et viande en France

Réseau thématique « Systèmes Ovins Bio » Retours de pratiques sur la Gestion sanitaire dans les élevages Ovins Bio

QUE DIT LE CAHIER DES CHARGES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN MATIÈRE DE GESTION SANITAIRE ?

« La prévention est prioritaire. Les traitements curatifs sont à employer de manière limitée. L'utilisation **en préventif** de médicaments allopathiques, antibiotiques ou bolus de molécules allopathiques de synthèse **est interdite**.

Les produits homéopathiques, phytothérapeutiques et les oligoéléments sont à utiliser de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques. »



QUELLES SONT VOS PRIORITÉS POUR AVOIR DES ANIMAUX EN BONNE SANTÉ ?


Alimentation
Bâtiment
Minéraux
Qualités
maternelles
Parasitisme
Pâturage
Rusticité
Vaccination

Les 3 premières priorités énoncées par les éleveurs sont :

- L'alimentation via l'équilibre de la ration et la qualité des fourrages.
- L'ambiance bâtiment
- La qualité du cheptel et la race

Au-delà de l'alimentation, certains mentionnent directement l'importance du pâturage et/ou d'une complémentation en oligo/minéraux/vitamines, pour couvrir les besoins des animaux, leur assurant une bonne santé

QUELLES MÉTHODES UTILISEZ-VOUS ?



La phytothérapie est la plus utilisée dans les élevages, avec 7 éleveurs/11.

D'autres méthodes sont utilisées : homéopathie (5/11), les probiotiques/kéfir (4/11), l'ostéopathie, les fleurs de Bach, le vinaigre.

Tous mentionnent l'utilisation de l'argile en libre service.

LES ÉLEVEURS NOUS PARTAGENT LEURS PRATIQUES

PRÉVENTION DIARRHÉES

Charlotte, 400♀ Pool Dorset en Mayenne

- 2 jets de Kéfir dans la gueule à la naissance pourensemencer le système digestif
- 500g d'asséchant aromatique par jour par case d'agnelage, à base d'argile pour réguler le ph en bergerie
- Beaucoup de paille, malgré son achat
- 2 longs vides sanitaires de la bergerie (système herbager pâturant)

PRÉVENTION ECHTYMA

Guillaume, 315 ♀ Est à laine Mérinos dans la Meuse

- Argile mis à disposition dans les coins agneaux
- Houx à changer chaque année



Houx à renouveler tous les ans

PRÉVENTION PASTEURELLOSE

Vincent, 300♀ F1 Ile de France x Grivette en Côte d'Or

- Bâtiment avec gestion de la ventilation pour une bonne ambiance
- Surface aire paillée par brebis + agneaux > 3m² (faible densité)
- Des lots qui tournent dans le bâtiment avec 3 périodes d'agnelages



PRÉVENTION ARTHRITE

Cédric, 160 ♀ dans les Alpes de Hte Provence

- Pose des boucles d'authentification en fonction de la connaissance des points d'acupuncture
- Cordon non coupé + Teinture Iode + Pommade à base d'huiles essentielles


PRÉVENTION COCCIDIOSE

Romain, 120♀ Thônes et Marthod en Isère

- 3% de Vinaigre dans l'eau de boisson des agneaux
- Argile enrichie en poudre d'ail

Points d'acupuncture de l'oreille :

articulation du tarse



articulation du carpe


Les huiles essentielles à l'essai

La ferme expérimentale de Carmejeane (Alpes de Hte Provence) a comparé pendant plusieurs années, l'efficacité de différents produits désinfectants ou cicatrisants lors de la pose des boucles électroniques.

1200 agneaux ont été intégrés à l'étude. Les signes d'échauffement et d'infection ont été notés.


Les résultats de l'étude témoignent d'une diminution significative des signes d'échauffement ou d'infection lors d'utilisation d'huiles essentielles.

Par contre, il n'y a pas de différence significative entre les huiles testées. L'emploi des huiles essentielles pures ciblées sur leurs actions antibactériennes est à éviter. Il est préconisé de les diluer à 20%.



Faire le point sur son taux de mortalité agneaux

Taux de mortalité de 32 élevages ovins en AB en 2022
(Source : Socle National Réseau Elevage INOSYS)



16,7% en moyenne

Dans les élevages ovins bios suivis dans INOSYS, le taux de mortalité agneaux varie de <5% jusqu'à >30%

Vigilance sur l'alimentation fin de gestation et son impact sur la mortalité agneaux :

Selon les résultats d'une étude réalisée au Ciirpo, un déficit alimentaire énergétique et azoté de 20% (soit entre 200 et 300g d'aliment en concentré en moins par jour) au cours des 6 dernières semaines de gestation a des conséquences importantes dès l'agnelage.

Le poids des agneaux et leur vigueur sont directement impactés. Les brebis nourries conformément à leurs besoins agnellent plus facilement (14% de brebis en plus qui agnellent sans aide, 9% de brebis en moins avec un agnelage difficile).

Leurs agneaux sont plus lourds de 690g à la naissance, et les aides majeures à la tétée, c'est-à-dire plus d'une fois pour le même agneau, sont diminuées de 19%.

Ainsi, on observe un taux de mortalité global de leurs agneaux plus faible (3,3% contre 9,5%).



ZOOM SUR LES MÉTHODES DE PRÉVENTION SANITAIRE DE :

Cédric Breissand, Co-gérant du GAEC des Breissand sur la commune du Castellar Mélan (04) éleveur préalpin sédentaire.

Troupeau de 160 brebis Mourerous (et quelques Préalpes) en bio depuis 2013.

Mises Bas en janvier et septembre // Taux Mortalité Agneaux : 12,7% (sur 7 ans)

« J'ai mis en place certaines habitudes pour préserver la santé de mon troupeau :

- Pour faire tampon dans la panse : de la paille, plutôt d'orge, à volonté toute l'année, même l'été (les brebis sont rentrées la nuit, à cause de la prédation).
- 1 fois par mois, j'applique un activateur de litière (20 kg sur 300m² de litière - Additif de compostage qui contient des microorganismes)
- J'accroche du houx au mur de la bergerie (assez haut pour que les brebis n'y aient pas accès) : 4 gros fagots pour 400m². Je n'ai aucune idée de comment cela fonctionne mais « les vieux le disaient » et depuis que je le fais je n'ai plus jamais eu d'ecthyma.
- 2 mois avant les mises bas de janvier, je fais une cure d'une semaine d'huile de foie de morue (5cc/ brebis et par jour) pour renforcer l'immunité de la brebis et de son colostrum. Je renouvelle le mois suivant. Et en cas d'agneau mou à la naissance, 2cc à la naissance à renouveler éventuellement.
- 1 semaine avant les mises-bas de janvier, je fais une cure de chlorure de magnésium dans le sel (Nigari 2.5 g/brebis/jour) pour faciliter les mises-bas et la délivrance.
- Suite aux mises bas, je fais une cure de fleur de soufre (1 % dans le sel - 1 mois)
- Les agneaux ont accès à de l'argile à volonté dès la naissance.
- En prévention coccidiose, je mets systématiquement du vinaigre de cidre dans l'eau de boisson (10%). Je débute une semaine avant qu'ils commencent à manger du concentré, c'est-à-dire chez moi autour de 3 semaines (il ne faut pas qu'ils aient accès à une autre eau pour privilégier la consommation).

Fiche réalisée par : Catherine VENINEAUX- Chambre d'agriculture de l'Isère (catherine.venineaux@isere.chambagri.fr) Gilles SAGET- Institut de l'élevage (gilles.saget@idele.fr), Marie BREISSAND - Chambre d'agriculture Alpes de Hte Provence, Aurore PETIT - Chambre d'agriculture Aveyron, Cléane HERNANDEZ - Chambre d'agriculture Côte d'Or, Tania Körner - Chambre d'agriculture Meuse, Sandrine Merlin - Chambre d'agriculture Pyrénées Atlantique, Aurore Prieur de la Comble - Chambre d'agriculture Pays de la Loire

Document édité par l'Institut de l'Élevage

149, Rue de Bercy - 75595 Paris Cedex 12 - www.idele.fr

Mars 2025 - Réf. : 0025 602 018

Conception : Beta Pictoris - Réalisation : Sarah Dauphin (idele) (Institut de l'Élevage) - Crédits photos : M. Leclerc / Idele

Pour en savoir plus : <https://inosys-reseaux-elevage.fr>

EN SAVOIR PLUS

Le recueil de bonnes pratiques :



Les pages santé et sanitaire du site INN'OVINS :



Santé et sanitaire



Un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs de l'Institut de l'Élevage et des Chambres d'agriculture pour produire des références sur les systèmes d'élevages. Ce document a été élaboré avec le soutien financier du Ministère de l'Agriculture (CasDar) et de la CNE.

