

TÉMOIGNAGE
Réseaux thématiques
2021/2027

Le réseau thématique « Signes d'Identification de Qualité et d'Origine (SIQO) et Finition à l'herbe » mobilise des éleveurs bovins viande sur toute la France pour produire des références technico-économiques.

Le suivi des fermes de ce réseau vise à explorer les conduites de finition basées sur l'herbe (pâturée ou conservée) des bovins produits sous signe officiels de qualité.

Agriculture bio



Viande bovine bio

Produit : Ensemble des animaux conduit sous le cahier des charges de l'agriculture biologique

Filière : 5,7 % du cheptel allaitant national

Débouchés : Grandes surfaces, distributions spécialisées, artisans, RHD

Spécificités du cahier des charges :

- 0 engrais chimique
- 0 produit phytosanitaire
- Aliment bio uniquement
- 0 OGM
- 3 traitements allopathiques par animal par an.



Élevage bovins viande
en région Pays de la Loire

EARL des grandes prairies, en Pays de la Loire : produire des animaux croisés exclusivement à l'herbe

Chiffres clés de l'exploitation

Main-d'œuvre :

1,0 UMO, Anaïs.

SAU :

136 ha, dont 136 ha d'herbe

Troupeau :

50 VA croisées charolais x angus

Production de viande :

20 vaches de réformes à 310 kg carc, 7 bœufs de 32 mois à 400 kg carc. broutards et broutardes.

Commercialisation :


Négociants

Chargement apparent :

0,7 UGB /ha SFP

Figure 1

Assolement



■ Prairie Naturelle ■ Prairie temporaire

Bilan des ventes sous SIQO

2021	NOMBRE	ÂGE	POIDS CARCASSE	ETAT ENGRAISSEMENT	CONFORMATION
Vaches	20	7 ans	307 kg	3	O+
Bœufs	7	32 mois	300 kg	3	R-

Le nombre de broutards et de bœufs produit est décidé en fonction des stocks fourragers.

OBJECTIFS DE L'ÉLEVEUSE

Simple

Le croisement Charolais X Angus a été choisi pour la facilité de vêlage et la rusticité des animaux ce qui simplifie grandement l'astreinte au vêlage et la surveillance quotidienne.

100% herbe

L'objectif est de ne pas faire de culture et donc 100 % herbe.

Econome

L'élevage tire sa rentabilité de l'absence de charges et en particulier l'absence d'aliments concentrés auto-produits ou achetés.

La qualité de finition des animaux n'est pas prioritaire car les animaux partent principalement en steak haché. Ainsi ils sont vendus à des conformations faibles (O+/R-).

FINITION À L'HERBE

Au pâturage (mode privilégié)

Pour les vaches allaitantes et les bœufs. Pâturage tournant 7 jours sur les prairies temporaires riches en trèfle. Les vaches à l'engrais sont les premières à sortir, le déprimage leur permet de faire la transition alimentaire avant la pleine pousse de l'herbe et donc de valoriser au mieux le pâturage. Les vaches sont engraisées en 2 à 3 mois au pâturage avec un GMQ supérieur à 1200 gr.

A l'auge (limité au minimum)

100 % enrubannage et foin sans complémentation. Pour un GMQ moyen de 900 gr.

GESTION DE L'HERBE

Réalise un pâturage tournant (7 jours) selon les lots pour valoriser toute l'herbe.

En hiver, les génisses et les bœufs restent au près, conduits en pâturage libre.

Semis des prairies temporaires en fétuque élevée trèfle blanc sous couvert de méteil fourrager.

Trie les stocks et garde les meilleurs pour l'engraissement.

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

La performance en engraissement est limitée par la qualité de l'herbe disponible, comme c'est au pâturage que les performances sont les meilleures, les ventes sont saisonnées avec un maximum de ventes en fin de pousse de l'herbe (juillet-août).

La technicité n'est pas dans la conduite animale mais dans la capacité à avoir une pousse de l'herbe la plus étalée et la plus qualitative possible.

Les points clefs de maîtrise sont donc :

- Éviter le surpâturage qui dégrade la flore prairiale et diminue la durée de vie des prairies.
- Avoir des temps de repos ou régénération des prairies qui permettent si possible du re semis ou au moins une bonne vigueur du couvert en place.
- Avoir des pratiques agronomiques (fumures, piétinement hivernal, amendements, choix variétaux) qui permettent une bonne productivité et une bonne qualité de la prairie.

Témoignage

Anaïs Voland,
éleveuse à Ligné (44)



Pourquoi produire sous SIQO ?

« En premier lieu car je ne veux pas utiliser de produits phytosanitaires ni d'engrais chimiques.

Mes terres sont superficielles et hydromorphes, c'est la portance du sol qui pilote le pâturage il n'y a donc pas d'intérêt à fertiliser pour avoir de l'herbe tôt en saison ».

Quels conseils pour bien gérer l'herbe ?

« Attention au surpâturage, c'est un vrai cercle vicieux, ça défavorise les espèces plantées et favorise l'agrostis ou le paturin, dès le rendement s'effondre ce qui accentue la pression de pâturage sur les autres prairies ».

« Limiter le nombre de lots en regroupant les catégories équivalentes (génisses et bœufs, gestantes...) permet de limiter le tri des animaux quitte à les faire tourner plus vite et simplifie le suivi de pâturage ».

Comment optimiser la finition à l'herbe ?

« Je veille à n'avoir pas d'animaux trop maigres de façon à raccourcir le plus la durée d'engraissement. C'est d'ailleurs de plus en plus facile au fur et à mesure de l'absorption du croisement Angus.»

Fiche réalisée par :

Vincent LAMBRECHT - Chambre d'agriculture des Pays de la Loire
(06 78 84 45 49)

Document édité par l'Institut de l'Élevage

149, Rue de Bercy - 75595 Paris Cedex 12 - www.idele.fr

Décembre 2023 - Réf. Idele : 0023 311 008

Conception : Beta Pictoris - Réalisation : Mélanie Colombel
(Institut de l'Élevage) - Crédits photos : Vincent Lambrecht

Pour en savoir plus : www.inosys-reseaux-elevage.fr



Un dispositif partenarial associant des éleveurs, et des ingénieurs de l'Institut de l'Élevage et des Chambres d'agriculture pour produire des références sur les systèmes d'élevages. Ce document a été élaboré avec le soutien financier du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (CasDAR) et de la CNE.

